
Инструкция по применению
Глюкостерил раствор для инфузий 20% 500 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Фрезениус Каби Дойчланд
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Декстроза
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 20%



Действующее вещество

Декстроза

Состав

1 л декстрозы моногидрат 220 г, что соответствует содержанию декстрозы безводной 200 г энергетическая ценность 3360 кДж/л (800 ккал/л) теоретическая осмолярность 1110 мОсм/л. Вспомогательные вещества: хлористоводородная кислота 25% - q.

Форма выпуска

Раствор

Показания

— гипогликемия — недостаточность углеводного питания — токсикоинфекции — интоксикации при заболеваниях печени (гепатит, дистрофия и атрофия печени, печеночная недостаточность) — геморрагический диатез — дегидратация (рвота, диарея, послеоперационный период) — интоксикация — коллапс — шок. Является компонентом различных кровезамещающих и противошоковых жидкостей для приготовления растворов лекарственных средств для в/в введения.

Противопоказания

— гипергликемия — сахарный диабет — гиперлактацидемия — гипергидратация — послеоперационные нарушения утилизации глюкозы — циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких — отек мозга — отек легких — острая левожелудочковая недостаточность — гиперосмолярная кома — повышенная чувствительность. С осторожностью: декомпенсированная сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (олигурия или анурия), гипонатриемия.

Побочные действия

Гипергликемия, гиперволемия, острая левожелудочковая недостаточность. В месте введения развитие инфекции, тромбофлебит.

Особые указания

Гипергликемия, гиперволемия, острая левожелудочковая недостаточность. В месте введения развитие инфекции, тромбофлебит.