Инструкция по применению
Глюкоза Буфус Раствор для инъекций ампулы 40 % 10 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Декстроза
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мл



Описание

Прозрачная бесцветная или со слегка коричневато-желтоватым оттенком жидкость.

Действующее вещество

Декстроза

Состав

1 мл раствора содержит:Действующее вещество: декстрозы моногидрат (в пересчете на сухое вещество декстрозу) - 400 мг,вспомогательные вещества: 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты) - до pH 3,0-4,0, натрия хлорид 0,26 мг, вода для инъекций до 1 мл.

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

Усваивается полностью организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания

Гипогликемия, недостаточность углеводного питания, токсикоинфекция, интоксикации при заболеваниях печени (гепатит, дистрофия и атрофия печени, в том числе печеночная недостаточность), геморрагический диатез, интоксикация, коллапс, шок. Как компонент различных кровезамещающих и противошоковых жидкостей, для приготовления растворов лекарственных средств для внутривенного введения.

Способ применения и дозы

Внутривенно капельно - до 30 кап/мин (1,5 мл/мин), максимальная суточная доза для взрослых - 250 мл.Для более полного усвоения декстрозы, вводимой в больших дозах, одновременно с ней назначают инсулин из расчета 1 ЕД инсулина на 4-5 г декстрозы.Больным диабетом декстрозу вводят под контролем ее содержания в крови и моче.

Противопоказания

Гиперчувствительность, гипергликемия, гиперлактацидемия, гипергидратация, послеоперационные нарушения утилизации глюкозы, циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких, отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, гиперосмолярная кома, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение декстрозы при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

Нарушения ионного баланса, гипергликемия, глюкозурия, лихорадка, гиперволемия, острая левожелудочковая недостаточность.В месте введения - развитие инфекции, тромбофлебит.

Передозировка

Симптомы: гипергликемия, глюкозурия, гипергликемическая гиперосмолярная кома, гипергидратация, нарушение водно-электролитного баланса.Лечение: прекратить введение глюкозы, ввести инсулин, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При комбинации с другими лекарственными средствами необходимо визуально контролировать совместимость (возможна невидимая фармацевтическая или фармакодинамическая несовместимость).

Особые указания

Раствор глюкозы нельзя вводить быстро или длительное время.Если в процессе инфузии раствора возникает озноб, введение следует немедленно прекратить.Для предотвращения тромбофлебита раствор следует вводить медленно, через крупные вены.При комбинации с другими лекарственными средствами необходимо визуально контролировать совместимость.Больным сахарным диабетом декстрозу вводят под контролем ее содержания в крови и моче.