Инструкция по применению
Глюкоза Раствор для инфузий 5 % 250 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Беларусь
Производитель: Фармлэнд СП
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Декстроза
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%

Действующее вещество

Декстроза

Состав

Действующие вещества: глюкозы в пересчете на безводную (декстроза) 50 г или 100 г, Вспомогательные вещества: натрия хлорид 0,26 г, раствор хлористоводородной кислоты 0,1 М до pH 3,0-4,1 вода для инъекций до 1000 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

5% раствор глюкозы применяется для быстрого восполнения объема жидкости при клеточной внеклеточной и общей дегидратации а также как компонент кровозамещающих и противошоковых жидкостей.

Способ применения и дозы

Изотонический раствор декстрозы (5%) вводят подкожно внутривенно (капельно) а также в прямую кишку в клизмах капельно по 300-500 мл.Для более полного и быстрого усвоения глюкозы можно ввести подкожно 4-5 ЕД инсулина.

Противопоказания

Раствор глюкозы не может применяться совместно с кровью консервированной ACD. Инфузия больших объемов глюкозы может быть опасна у больных у которых имеется большая потеря электролитов. Гипергликемия. Сахарный диабет.

Побочные действия

Гипергликемия лихорадка гиперволемия острая левожелудочковая недостаточность.В месте введения - развитие инфекции тромбофлебит.

Особые указания

Следить за электролитным балансом!Необходим контроль за уровнем сахара в крови. Замораживание препарата при условии сохранности герметичности не является противопоказанием к его применению.

Условия хранения

При температуре от 5 до 30 ° С.Хранить в недоступном для детей месте.