Инструкция по применению
Глюкоза Раствор для инфузий 40 % 10 мл ампулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Декстроза
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 40%

Описание

Прозрачная бесцветная или со слегка коричневато-желтоватым оттенком жидкость.

Действующее вещество

Декстроза

Состав

1 мл декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) 400 мг Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0.26 мг, хлористоводородная кислота 0.1М раствор - до pH 3.0-4.0, вода д/и до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Усваивается полностью организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания

Гипогликемия, недостаточность углеводного питания, токсикоинфекция, интоксикации при заболеваниях печени (гепатит, дистрофия и атрофия печени, в том числе печеночная недостаточность), геморрагический диатез, интоксикация, коллапс, шок. Как компонент различных кровезамещающих и противошоковых жидкостей, для приготовления растворов лекарственных средств для внутривенного введения.

Способ применения и дозы

Внутривенно капельно – до 30 кап/мин (1,5 мл/мин), максимальная суточная доза для взрослых – 250 мл. Для более полного усвоения декстрозы, вводимой в больших дозах, одновременно с ней назначают инсулин из расчета 1 ЕД инсулина на 4-5 г декстрозы. Больным диабетом декстрозу вводят под контролем ее содержания в крови и моче.

Противопоказания

Гиперчувствительность, гипергликемия, гиперлактацидемия, гипергидратация, послеоперационные нарушения утилизации глюкозы, циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких, отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, гиперосмолярная кома, детский возраст.

Побочные действия

Нарушения ионного баланса, гипергликемия, глюкозурия, лихорадка, гиперволимия, острая левожелудочковая недостаточность. В месте введения – развитие инфекции, тромбофлебит.

Передозировка

Симптомы: гипергликемия, глюкозурия, гипергликемическая гиперосмолярная кома, гипергидратация, нарушение водно-электролитного баланса. Лечение: прекратить введение глюкозы, ввести инсулин, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При комбинации с другими лекарственными средствами необходимо визуально контролировать совместимость (возможна невидимая фармацевтическая или фармакодинамическая несовместимость).