Инструкция по применению
Глюкоза раствор для инфузий флакон 5% 400 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МЕДПРО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Декстроза
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%



Описание

5%-ный раствор глюкозы для инфузий во флаконе - средство для регидратации и дезинтоксикации.Изотонический раствор декстрозы используется для пополнения организма жидкостью. Кроме того, он является источником ценного питательного вещества, которое легко усваивается. При метаболизме глюкозы в тканях выделяется значительное количество энергии, необходимой для жизнедеятельности организма. При внутривенного введении гипертонических растворов повышается осмотическое давление крови, усиливается ток жидкости из тканей в кровь, повышаются процессы обмена веществ, улучшается антитоксическая функция печени, усиливается сократительная деятельность сердечной мышцы, расширяются сосуды, увеличивается диурез.

Действующее вещество

Декстроза

Состав

Декстрозы моногидрат.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Возмещение недостатка углеводов в организме. Коррекция дегидратации вследствие рвоты, диареи, в послеоперационном периоде. Дезинтоксикационная инфузионная терапия. Коллапс, шок (как компонент различных кровезамещающих и противошоковых жидкостей). Используется для приготовления растворов лекарственных средств для в/в введения.

Способ применения и дозы

5% раствор: максимально до 150 капель/мин, максимальная суточная доза для взрослых - 2 л.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение декстрозы при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

Со стороны обмена веществ: возможны нарушения ионного баланса, гипергликемия. Со стороны сердечно-сосудистой системы: гиперволемия, острая левожелудочковая недостаточность.Прочие: лихорадка.Местные реакции: редко - местное раздражение, развитие инфекции, тромбофлебит.

Передозировка

Симптомы: Гипергликемия, глюкозурия, гипергликемическая гиперосмолярная кома, гипергидратация, нарушение водно-электролитного баланса. Лечение: Прекратить введение декстрозы, ввести инсулин, симптоматическая терапия.

Особые указания

Противопоказания к применению: гипергликемия, сахарный диабет, гиперлактацидемия, гипергидратация, послеоперационные нарушения утилизации глюкозы, циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких, отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, гиперосмолярная кома.