Инструкция по применению
Глутоксим Раствор для инъекций Ампулы 3 % 1 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Фарма Вам
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 30 мг/мл
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия

Форма выпуска

Ампулы

Показания

– профилактика и лечение вторичных иммунодефицитных состояний, связанных с радиационными, химическими и инфекционными факторами – восстановление подавленных иммунных реакций и угнетенного состояния костно-мозгового кроветворения – повышение устойчивости организма к различным воздействиям (инфекция, интоксикация, радиация) – в качестве гепатопротекторного средства при острых и хронических гепатитах В и С с ликвидацией объективных признаков хронического вирусоносительства – потенцирование лечебных эффектов антибактериальной терапии хронических обструктивных заболеваний легких – тяжелые, распространенные формы туберкулеза различной локализации (в составе комплексной терапии) – туберкулез, резистентный к лекарственной терапии – лечение токсических осложнений противотуберкулезной терапии – заболевания мочеполовой системы (хронический пиелонефрит, гломерулонефрит) – профилактика послеоперационных гнойных осложнений.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат Глутоксим вводят в/в, в/м и п/к в дозе 5-40 мг ежедневно в зависимости от тяжести заболевания. Курсовая доза - 50-300 мг. При туберкулезе (в составе комплексной терапии) препарат назначают в/в или в/м по 30 мг 2 раза/сут ежедневно в течение 2 мес. После перехода специфического воспаления в продуктивную фазу препарат назначают в/м в суточной дозе 10-20 мг 1-2 раза/сут (утром и вечером) 3 раза в неделю. При необходимости проводят повторный курс лечения через 1-6 мес. С профилактической целью препарат применяют в/м в дозе 5-10 мг ежедневно в течение 10 дней. В качестве растворителя при инфузионном введении препарата следует использовать изотонический раствор натрия хлорида или 5% раствор декстрозы (глюкозы).

Противопоказания

– беременность – лактация (грудное вскармливание) – повышенная чувствительность к компонентам препарата Глутоксим.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Возможно: в отдельных случаях - повышение температуры тела (37.1-37.5°С), болезненность в месте введения препарата (для уменьшения болезненности возможно введение препарата одновременно с 1-2 мл 0.5% раствора новокаина).