Инструкция по применению
Гонадотропин хорионический 1500 ед флаконы 5 шт + растворитель



Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: МЭЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гонадотропин хорионический
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 1500 ЕД

Действующее вещество

Гонадотропин хорионический

Состав

Человеческий хорионический гонадотропин 1500 МЕ. Растворитель: натрия хлорида р-р д/и 0.9% - 1 мл.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Для женщин: индукция овуляции после стимуляции роста фолликулов; поддержание функции желтого тела яичника у пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы.Для мальчиков и мужчин: крипторхизм (эктопия, ретенция яичек в брюшной полости или в паховом канале); задержка полового созревания; гипогонадотропный гипогонадизм (в комбинации с препаратами человеческого менопаузного гонадотропина); при проведении дифференциально-диагностического теста анорхизма и крипторхизма у мальчиков; при проведении функционального теста Лейдига для оценки функции яичек при гипогонадотропном гипогонадизме перед началом долгосрочного стимулирующего лечения.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и схемы лечения.

Противопоказания

Опухоли различной локализации, зависимые от половых гормоноворганически обусловленный крипторхизм (паховая грыжа, последствия оперативных вмешательств в паховой области, неправильное положение яичек) у мальчиков и мужчинповышенная чувствительность к хорионическому гонадотропину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Существует повышенный риск невынашивания и/или развития многоплодной беременности после лечения гонадотропинами.

Побочные действия

Со стороны эндокринной системы у женщин: возможно развитие синдрома гиперстимуляции яичников, сопровождающегося развитием кист яичников с опасностью их разрыва, асцитом, гидротораксом и опасностью тромбоэмболии. Со стороны эндокринной системы у мальчиков и мужчин: возможны временное обратимое увеличение молочных желез, предстательной железы, задержка воды и электролитов, обыкновенные угри . у мальчиков возможны изменения поведения, аналогичные наблюдаемым во время первой фазы полового созревания, которые проходят после окончания лечения.

Особые указания

Со стороны эндокринной системы у женщин: возможно развитие синдрома гиперстимуляции яичников, сопровождающегося развитием кист яичников с опасностью их разрыва, асцитом, гидротораксом и опасностью тромбоэмболии. Со стороны эндокринной системы у мальчиков и мужчин: возможны временное обратимое увеличение молочных желез, предстательной железы, задержка воды и электролитов, обыкновенные угри . у мальчиков возможны изменения поведения, аналогичные наблюдаемым во время первой фазы полового созревания, которые проходят после окончания лечения.