Инструкция по применению
Гонадотропин хорионический Лиофилизат 5000 ЕД 5 шт + Растворитель

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: МЭЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гонадотропин хорионический
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 5000 ЕД



Действующее вещество

Гонадотропин хорионический

Состав

Человеческий хорионический гонадотропин 5000 МЕ. Растворитель: натрия хлорида р-р д/и 0.9% - 1 мл.

Форма выпуска

Ампулы

Способ применения и дозы

Показания к применению Для женщин: индукция овуляции после стимуляции роста фолликуловподдержание функции желтого тела яичника у пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы. Для мальчиков и мужчин: крипторхизм (эктопия, ретенция яичек в брюшной полости или в паховом канале)задержка полового созреваниягипогонадотропный гипогонадизм (в комбинации с препаратами человеческого менопаузного гонадотропина)при проведении дифференциально-диагностического теста анорхизма и крипторхизма у мальчиковпри проведении функционального теста Лейдига для оценки функции яичек при гипогонадотропном гипогонадизме перед началом долгосрочного стимулирующего лечения.

Противопоказания

Индивидуальный, в зависимости от показаний и схемы лечения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется длительное применение вследствие возможного образования антител, снижающих эффективность лечения. В случае развития синдрома гиперстимуляции яичников следует прекратить применение.

Побочные действия

Опухоли различной локализации, зависимые от половых гормоновторганически обусловленный крипторхизм (паховая грыжа, последствия оперативных вмешательств в паховой области, неправильное положение яичек) у мальчиков и мужчинповышенная чувствительность к хорионическому гонадотропину.

Особые указания

Опухоли различной локализации, зависимые от половых гормоновторганически обусловленный крипторхизм (паховая грыжа, последствия оперативных вмешательств в паховой области, неправильное положение яичек) у мальчиков и мужчинповышенная чувствительность к хорионическому гонадотропину.