Инструкция по применению
Гопантам Таблетки 500 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гопантеновая кислота
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Описание

Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

Действующее вещество

Гопантеновая кислота

Состав

В качестве активного вещества 0,5 г гопантеновой кислоты. Вспомогательные вещества: магний углекислый основной, кальция стеарат, тальк, метилцеллюлоза.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Гопантеновая кислота быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта проникает через гематоэнцефалический барьер наибольшие концентрации создаются в печени почках стенке желудка и коже. Препарат не метаболизируется и выводится в неизменном виде в течение 48 часов: 675% от принятой дозы - с мочой 285% - с калом.

Показания

- Экстрапирамидные нарушения (миоклонус-эпилепсия хорея Гентингтона гепатолентикулярная дегенерация болезнь Паркинсона и др.), - Когнитивные нарушения при органических поражениях головного мозга в том числе при последствиях нейроинфекций черепно-мозговых травм и невротических расстройствах, - При экстрапирамидальных гиперкинезах у больных с наследственными заболеваниями нервной системы в комбинации с проводимой терапией, - В качестве корректора при побочном действии нейролептических средств при нейролептическом экстрапирамидном синдроме (гиперкинетическом и акинетическом) в составе комплексной терапии при церебральной органической недостаточности у больных шизофренией, - Эпилепсия с замедлением психических процессов в комплексной терапии с противосудорожными средствами, - Психоэмоциональные перегрузки снижение умственной и физической работоспособности для улучшения концентрации внимания и запоминания, - Нейрогенные расстройства мочеиспускания (поллакиурия императивные позывы императивное недержание мочи энурез), - Детям с задержкой развития (психического речевого моторного или их сочетания) в том числе на фоне перенесенной перинатальной энцефалопатии и у детей с различными формами детского церебрального паралича, - Детям при гиперкинетических расстройствах (синдроме гиперактивности с дефицитом внимания), - Детям при неврозоподобных состояниях (тиках, при заикании преимущественно при клонической форме).

Способ применения и дозы

Внутрь через 15-30 минут после еды. Разовая доза для взрослых обычно составляет 250-1000 мг для детей - 250-500 мг, суточная доза для взрослых - от 1500 мг до 3000 мг, для детей - от 750 мг до 3000 мг. При когнитивных нарушениях при органических поражениях головного мозга в том числе при последствиях нейроинфекций черепно-мозговых травм и невротических расстройствах: по 250 мг 3-4 раза в сутки. При экстрапирамидальных гиперкинезах у больных с наследственными заболеваниями нервной системы в комбинации с проводимой терапией: в дозе от 500 мг до 3000 мг в сутки. Курс лечения - до 4 и более месяцев. В качестве корректора при побочном действии нейролептических средств при нейролептическом экстрапирамидном синдроме (гиперкинетическом и акинетическом) в составе комплексной терапии при церебральной органической недостаточности у больных шизофренией: взрослым - в дозе от 500 мг до 1000 мг 3 раза в сутки, детям - в дозе от 250 мг до 500 мг 3-4 раза в сутки. Курс лечения - 1-3 месяца. При эпилепсии с замедлением психических процессов в комплексной терапии с противосудорожными средствами: взрослым - в дозе от 500 мг до 1000 мг 3 раза в сутки, детям - в дозе от 250 мг до 500 мг 3-4 раза в сутки. Курс лечения - до 6 месяцев. При психоэмоциональных перегрузках снижении умственной и физической работоспособности для улучшения концентрации внимания и запоминания: по 250 мг 3 раза в сутки. При нейрогенных расстройствах мочеиспускания: взрослым - в дозе от 500 мг до 1000 мг 2-3 раза в сутки, детям - в дозе от 250 мг до 500 мг 3 раза в сутки (суточная доза составляет 25-50 мг/кг). Курс лечения - 1-3 месяца. Детям с различной патологией нервной системы в зависимости от возраста препарат рекомендуется в дозе 1000-3000 мг в сутки. Тактика назначения препарата: наращивание дозы в течение 7-12 дней прием в максимальной дозе на протяжении 15-40 дней и постепенное снижение дозы до отмены Гопантеновой кислоты в течение 7-8 дней. Перерыв между курсовыми приемами Гопантеновой кислоты как и для любого другого ноотропного средства составляет от 1 до 3 месяцев. Детям с задержкой развития: по 500 мг 3-4 раза в сутки. Курс лечения 2-3 месяца. Детям с синдромом гиперактивности с дефицитом внимания: в зависимости от массы тела препарат назначают в средней терапевтической дозе 30 мг/кг в сутки утром и днем. Оптимальная доза определяется для каждого пациента индивидуально путем подбора с постепенным увеличением дозы в течение первых 5-7 дней. Курс лечения - 3-4 месяца. Детям при неврозоподобных состояниях (тиках, при заикании преимущественно при клонической форме): в дозе от 250 мг до 500 мг 3-6 раз в сутки. Курс лечения - от 1 до 4 месяцев в отдельных случаях - до 6 месяцев. Через 3-6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения. С учетом ноотпропного действия препарата его прием проводится предпочтительно в утренние и дневные часы (до 17 ч). Препарат применяется у детей старше 3 лет. В более раннем возрасте рекомендуется прием препарата в лекарственной форме сироп.

Противопоказания

Гиперчувствительность острые тяжелые заболевания почек беременность грудное вскармливание детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется в связи с отсутствием данных эффективности и безопасности.

Побочные действия

Нежелательные реакции представленные ниже перечислены в соответствии с поражением органов и систем и частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто (≥1/10) часто (≥1/100 и <1/10) не часто (≥1/1000 и <1/100) редко (≥1/10000 и <1/1000) очень редко (<1/10000 включая отдельные случаи). Нарушения со стороны иммунной системы Очень редко: аллергические реакции (ринит конъюнктивит кожные аллергические реакции). Нарушения со стороны нервной системы Очень редко: гипервозбуждение головная боль головокружение шум в голове. Нарушения психики Очень редко: вялость заторможенность нарушения сна сонливость. В случае возникновения нарушений со стороны иммунной системы отменяют препарат. В остальных случаях уменьшают дозу препарата.

Передозировка

Симптомы: нарушение сна или сонливость шум в голове. Лечение: активированный уголь промывание желудка симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Пролонгирует действие барбитуратов усиливает действие противосудорожных средств предотвращает побочные явления фенобарбитала карбамазепина нейролептиков. Эффект гопантеновой кислоты усиливается в сочетании с глицином этидроновой кислотой. Потенцирует действие местных анестетиков (прокаина).

Особые указания

Препарат применяется у детей старше 3 лет. В условиях длительного лечения не рекомендуется одновременное назначение препарата с другими ноотропными и стимулирующими средствами. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В первые дни приема следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и механизмами учитывая возможное возникновение сонливости (см. "Побочное действие").

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять препарат после истечения срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.