Инструкция по применению
Гормель СН Капли гомеопатические 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии при дисменореях.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 100 г препарата): Активные компоненты: Sepia officinalis (Сепия оффициналис) D6 5 г, Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальциум карбоникум Ганемании) D8 10 г, Acidum nitricum (Ацидум нитрикум) D4 5 г, Conyza canadensis (Кониза канаденсис) D3 5 г, Viburnum opulus (Вибурнум опулюс) D3 5 г, Pulsatilla pratensis (Пульсатилла пратензис) D4 5 г, Cyclamen purpurascens (Цикламен пурпуресценс) D4 5 г, Strychnos ignatii (Стрихнос игнации) D6 5 г, Aquilegia vulgaris (Аквилегия вульгарис) D4 10 г, Origanum majorana (Ориганум майорана) D4 10 г, Myristica fragrans (Миристика фрагранс) D6 10 г, Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 96% (об.), вода очищенная. Содержание этанола в препарате около 35 % (по объему).

Форма выпуска

Капли

Показания

Препарат применяется в комплексной терапии при дисменореях.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. Длительность терапии определяется врачом. Средний курс лечения составляет 1-3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. В составе препарата содержится около 35 % (по объему) спирта этилового. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,43 г спирта этилового.

Условия хранения

В сухом месте