**Инструкция по применению**
**Горпилс Пастилки Лимон 24 шт**

### Характеристики




Форма выпуска: Пастилки
Страна: Индия
Производитель: Gepach International
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт
Количество в упаковке: 24

### Описание

Пастилки лимонные:круглые, двояковыпуклые пастилки с шероховатой поверхностью, светло-жёлтого цвета с преобладающим запахом лимона. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета (опудривание).

### Действующее вещество

Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт

### Состав

Одна пастилка содержит: действующие вещества: амилметакрезол 0.6 мг 2,4-дихлорбензиловый спирт 1.2 мг вспомогательные вещества: пастилки лимонные кислота лимонная безводная 20.0 мг, левоментол 2.0 мг, мяты перечной листьев масло (масло ментоловое) 0.0012 мг, аниса семян масло (масло анисовое) 0.0023 мг, сахароза 1638 мг, декстроза (глюкоза) жидкая 1050 мг, масло лимонное концентрированное 0.007 мг, краситель хинолиновый желтый 0.09 мг,

### Форма выпуска

Пастилки

**Фармакокинетика**

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата Горпилс® отсутствуют.

**Показания**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний рта и глотки (боль при глотании).

**Способ применения и дозы**

Взрослым: каждые 2 часа рассасывать (до полного растворения) по 1 пастилке. Максимальная суточная доза - 8 пастилок. Детям с 5 лет: по 1 пастилке каждые 4 часа. Если симптомы заболевания не исчезают в течение трех дней, необходимо обратиться к врачу.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 5 лет).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

**Побочные действия**

Аллергические реакции.

**Передозировка**

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

**Особые указания**

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают. Препарат можно применять людям с сахарным диабетом, необходимо учитывать, что каждая пастилка ГОРПИЛС® содержит 2,6 г глюкозы и сахарозы (соответствует 0,25 хлебной единице). Нет сведений о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работу с механизмами.

**Условия хранения**

Хранить в сухом месте, при температуре 15-25°С. Хранить в недоступном для детей месте.