**Инструкция по применению**
**Горпилс Пастилки мед-лимон 24 шт**

### Характеристики




Форма выпуска: Пастилки
Страна: Индия
Производитель: Гепач
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт
Количество в упаковке: 1

### Описание

Пастилки лимонно-медовые: круглые, двояковыпуклые пастилки с шероховатой поверхностью, светло-жёлтого цвета с преобладающим запахом мёда и лимона. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета (опудривание).

### Действующее вещество

Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт

### Состав

Каждая пастилка содержит: активные вещества: амилметакрезол 0,6 мг, 2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 мг, вспомогательные вещества: пастилки лимонно-медовые кислота лимонная безводная, левоментол, мяты перечной листьев масло (масло ментоловое), аниса семян масло (масло анисовое), сахароза, декстроза (глюкоза) жидкая, мед, масло лимонное концентрированное, ароматизатор медовый, краситель хинолиновый желтый,

### Форма выпуска

Пастилки

**Показания**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний рта и глотки (боль при глотании).

**Способ применения и дозы**

Взрослым: каждые 2 часа рассасывать (до полного растворения) по 1 пастилке. Максимальная суточная доза - 8 пастилок. Детям с 5 лет: по 1 пастилке каждые 4 часа. Если симптомы заболевания не исчезают в течение трех дней, необходимо обратиться к врачу.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 5 лет).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

**Побочные действия**

Аллергические реакции.

**Передозировка**

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

**Особые указания**

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают. Препарат можно применять людям с сахарным диабетом, необходимо учитывать, что каждая пастилка ГОРПИЛС содержит 2,6 г глюкозы и сахарозы (соответствует 0,25 хлебной единице).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

**Условия хранения**

Хранить в сухом месте, при температуре 15-25°С. Хранить в недоступном для детей месте.