Инструкция по применению
Граммидин Спрей 112 доз

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Нидерланды
Производитель: Фамар Нидерланды
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачный или опалесцирующий бесцветный или желтоватый раствор с характерным запахом мяты.

Действующее вещество

Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид

Состав

Одна доза препарата содержит: Активные вещества: Грамицидина С дигидрохлорид - 0,0638 мг (в пересчете на грамицидин С - 0,06 мг) Цетилпиридиния хлорид - 0,10 мг Вспомогательные вещества: Этанол 96 % - 19,00 мг Сукралоза - 0,20 мг Глицерол - 33,20 мг Ароматизатор мятный - 0,82 мг Лимонной кислоты моногидрат - 0,058 мг Натрия цитрат - 0,022 мг Полисорбат 80 - 0,40 мг Метилпарагидроксибензоат (метилпарабен) - 0,184 мг Пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен) - 0,02 мг Вода очищенная - до 0,2 мл

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Препарат местного действия. По данным доклинических исследований фармакокинетики всасывание практически отсутствует.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: фарингит, тонзиллит, пародонтит, гингивит, стоматит.

Способ применения и дозы

Местно, путем распыления на слизистую оболочку полости рта и горла. Применяется после еды. Дозировка для взрослых: по 4 впрыска на одно применение 3 раза в день в течение 7 дней. Дозировка для детей от 6 до 18 лет: по 2 впрыска на одно применение 3 раза в день в течение 7 дней. Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1 часа. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

повышенная чувствительность к грамицидину С, цетилпиридиния хлориду и другим компонентам препарата \-беременность (I триместр) \-период грудного вскармливания \-детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью Беременность (II-III триместр). Перед применением препарата, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. Адекватных контролируемых исследований применения препарата при беременности не проводилось. Применение препарата в I триместре беременности противопоказано. Применение препарата во II-III триместре беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. Нет данных о проникновении компонентов препарата в грудное молоко. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: применение препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, может вызвать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, диарею. Лечение: следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время не описано случаев клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Не следует применять препарат при наличии открытых ран в полости рта, поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран. Препарат содержит этанол. В максимальной разовой дозе препарата содержание этанола составляет до 0,08 г.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.