Инструкция по применению
Грудной сбор №4 Сбор измельченный 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Растительное сырье
Страна: Россия
Производитель: Фитофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Смесь неоднородных частиц растительного сырья желтовато-зеленого цвета с желто-оранжевыми, красновато-коричневыми, серовато-коричневыми, темно-зелеными, серовато-зелеными, желтовато-белыми, желтовато-серыми или синевато-фиолетовыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-сладкий, слегка холодящий.

Состав

Ромашки аптечной цветки 20 % Багульника болотного побеги 20% Календулы лекарственной цветки 20% Фиалки трава 20% Солодки корни 15% Мяты перечной листья 5%.

Форма выпуска

Растительное сырье

Показания

В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит).

Способ применения и дозы

Около 9 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь по 1/3 стакана теплого настоя 3 раза в день до еды. Курс лечения 2-3 недели. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим растениям семейства Астровых, а также к салицилатам, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Побеги багульника болотного, входящие в состав препарата, могут вызвать головокружение, повышенную нервную возбудимость. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы. Передозировка препаратами побегов багульника болотного может вызывать серьезные побочные явления (симптомы возбуждения или угнетения) со стороны центральной нервной системы.

Взаимодействие с другими препаратами

Сбор не следует принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней следует сообщить об этом лечащему врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакции (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке). Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.