Инструкция по применению
Гуттасил Таблетки 7,5 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Миофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Описание

Действует как местное слабительное, активируется в толстом кишечнике под действием бактериальных сульфатаз и оказывает стимулирующее действие на чувствительные нервные окончания слизистой оболочки кишечника, усиливая его моторику. Время развития слабительного эффекта препарата определяется скоростью высвобождения активного метаболита и составляет 6–12 часов. Преимущество приема пикосульфата натрия состоит в том, что применение препарата не сопровождается тенезмами и спазмами кишечника, а также способствует стимуляции метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника.

Состав

Инулин (300 мг в двух таблетках), микрокристаллическая целлюлоза, пикосульфат натрия 7,5 мг в таблетке, магниевая (или кальциевая) соль стеариновой кислоты (агент антислеживающий). Действующее вещество - натрия пикосульфат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника инулина.

Способ применения и дозы

детям с 11 до 18 лет и взрослым по 1-2 таблетке 1 раз в день. Продолжительность приема - 8-10 дней. При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Противопоказания

Желудочно-кишечные и маточные кровотечения, боль в животе, тошнота, рвота неясного генеза, цистит, выраженная дегидратация, спастический запор, острые заболевания органов брюшной полости. Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Пищевая ценность в 1 таблетке: углеводы – 0,09г. Энергетическая ценность: кДж / ккал / 1 таблетку – 1,18 / 0,28.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.