Инструкция по применению
Ибупрофен Капсулы 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Фармпроект
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ибупрофен
Количество в упаковке: 50

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 1, корпус капсулы белого цвета с крышечкой зеленого цвета.Содержимое капсул - порошок белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Ибупрофен

Состав

Препарат Ибупрофен содержит: Действующим веществом является ибупрофен. Каждая капсула содержит 200 мг ибупрофена. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: Содержимое капсулы: кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат. Состав желатиновой капсулы: корпус: желатин, титана диоксид крышечка: желатин, титана диоксид, краситель хинолиновый желтый [E104], краситель синий патентованный V [E131], краситель «Солнечный закат» желтый [E110]. Препарат Ибупрофен содержит краситель «Солнечный закат» желтый [E110] (см. раздел «Особые указания»).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат Ибупрофен применяется у взрослых и детей в возрасте от 12 лет для лечения головной боли, мигрени (вид головной боли), зубной боли, при болезненных менструациях, невралгии, боли в спине, мышечных и ревматических болях, а также при лихорадочных состояниях при гриппе и простудных заболеваниях.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой. Рекомендуемая доза Только для кратковременного применения. Взрослые Внутрь по 1 капсуле (200 мг) до 3-4 раз в сутки. Интервал между приемами препарата должен составлять 6-8 часов. Для достижения более быстрого терапевтического эффекта у взрослых разовая доза может быть увеличена до 2 капсул (400 мг) до 3 раз в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 1200 мг. Применение у детей и подростков Не давайте препарат Ибупрофен детям в возрасте до 12 лет. Внутрь по 1 капсуле (200 мг) до 3-4 раз в сутки. Интервал между приемами препарата должен составлять 6-8 часов. Максимальная суточная доза для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет составляет 1000 мг. Путь и (или) способ введения Только для кратковременного применения. Внутрь, не разжевывая. Капсулы запивайте водой. Если Вы или Ваш ребенок забыли принять препарат Ибупрофен Если Вы или Ваш ребенок забыли вовремя принять очередную дозу, примите пропущенную дозу как можно скорее после того, как вспомнили о ней. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Если Вы или Ваш ребенок прекратили применение препарата Ибупрофен Если Вы или Ваш ребенок завершите применение препарата раньше срока, назначенного Вам или Вашему ребенку врачом, проконсультируйтесь дополнительно с лечащим врачом для продолжения или приостановки приема препарата. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте и не давайте Вашему ребенку препарат Ибупрофен: Если у Вас или у Вашего ребенка аллергия на ибупрофен или любые другие компоненты препарата Если у Вас или у Вашего ребенка полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов (в том числе в истории болезни) Если у Вас или у Вашего ребенка эрозивно-язвенные заболевания органов желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнь Крона, язвенный колит) или язвенное кровотечение в активной фазе или в истории болезни (два или более подтвержденных эпизода язвенной болезни или язвенного кровотечения) Если у Вас или у Вашего ребенка кровотечение или перфорация язвы желудочно-кишечного тракта в анамнезе, спровоцированные применением нестероидных противовоспалительных препаратов Если у Вас или у Вашего ребенка тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по NYHA - классификация Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов) Если у Вас или у Вашего ребенка тяжелая печеночная недостаточность или заболевание печени в активной фазе Если у Вас или у Вашего ребенка почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), подтвержденная гиперкалиемия (содержание калия в крови выше нормы) Если у Вас или у Вашего ребенка декомпенсированная сердечная недостаточность период после проведения аортокоронарного шунтирования Если у Вас или у Вашего ребенка цереброваскулярное (связанное с головным мозгом) или иное кровотечение Если у Вас или у Вашего ребенка гемофилия и другие нарушения свертываемости крови (в том числе гипокоагуляция - пониженная свертываемость крови), геморрагические диатезы (болезни, связанные со спонтанными и повышенными кровотечениями) Если у Вас срок беременности более 20 недель Если возраст Вашего ребенка до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Не применяйте препарат Ибупрофен при сроке беременности более 20 недель. Это может привести к возможному развитию маловодия и/или патологии почек у новорожденных (неонатальная почечная дисфункция). Избегайте применения препарата при сроке беременности менее 20 недель. При необходимости приема препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лактация (грудное вскармливание) Если Вы кормите грудью, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Кратковременное применение препарата в период грудного вскармливания возможно. При необходимости длительного применения препарата Ибупрофен обратитесь к врачу для решения вопроса о необходимости прекращения грудного вскармливания на период применения препарата.Ибупрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные препараты, может оказывать отрицательное действие на фертильность у женщин. Это обратимо после прекращения лечения. Не применяйте препарат Ибупрофен, если Вы планируете беременность или проходите обследование и лечение по поводу бесплодия.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Ибупрофен может вызывать нежелательные реакции, хотя они возникают не у всех. Вы можете свести к минимуму риск возникновения нежелательных реакций, если будете принимать препарат коротким курсом в минимальной эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. Нежелательные реакции преимущественно являются дозозависимыми. Прекратите прием препарата Ибупрофен и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если заметите любую из перечисленных ниже серьезных нежелательных реакций: Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): Аллергические реакции (зуд, крапивница) Головная боль Боль в животе, тошнота, диспепсия (в том числе изжога, вздутие живота) Различные формы кожной сыпи. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): Диарея, метеоризм (повышенное газообразование, сопровождающееся вздутием живота, чувством распирания и болью), запор, рвота. Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): Снижение количества красных кровяных телец (эритроцитов) и/или гемоглобина в крови - анемия снижение количества белых клеток крови (лейкоцитов) в крови - лейкопения снижение количества кровяных пластинок (тромбоцитов) в крови - тромбоцитопения снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови - панцитопения снижение количества специфических белых клеток крови -

гранулоцитов (агранулоцитоз). Лихорадка, боль в горле, поверхностные язвы на слизистой оболочке полости рта, гриппоподобные симптомы (такие как боль в горле, насморк или заложенность носа), выраженная слабость, необъяснимые кровотечения и кровоподтеки (синяки). Тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции, отек Квинке или тяжелый анафилактический шок, токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона). Симптомы могут включать отек лица, языка и гортани, ощущение нехватки воздуха (одышка), учащенное сердцебиение (тахикардия), снижение кровяного давления (гипотензия) эксфолиативный дерматоз (тяжелое инфекционное поражение кожи, характеризующееся покраснением кожи с образованием вялых пузырей, трансформирующихся в эрозии) и буллезный дерматоз (воспалительное поражение кожи с образованием на ней заполненных жидкостью пузырей). Воспалительная реакция, характеризующаяся образованием мишеневидных высыпаний (мультиформная эритема). Воспаление мозговых оболочек (асептический менингит). Симптомы могут включать избыточное напряжение (ригидность) затылочных мышц, головную боль, тошноту, рвоту, лихорадку и потерю ориентации. Язва в желудочно-кишечном тракте (пептическая язва), перфорация (прорыв стенки желудка или кишечника) или желудочно-кишечное кровотечение, а также воспалительный процесс, затрагивающий целостность слизистых оболочек ротовой полости и приводящий к образованию дефектов в виде язв (язвенный стоматит), процесс воспалительного характера в слизистой оболочке желудка (гастрит). Симптомы могут включать резкую и сильную боль в животе, появление черного полужидкого стула (мелена), кровавую рвоту. Нарушения функции печени (особенно, если применяете длительно), воспаление печени (гепатит), окрашивание кожи и склер глаз в желтый цвет (желтуха). Острая почечная недостаточность. Симптомы могут включать появление крови в моче (гематурии) и повышение концентрации мочевины в крови и появление белка в моче (протеинурии), нефритический синдром, нефротический синдром, разрушение тканей почек (папиллярный некроз), воспалительный процесс в почках (интерстициальный нефрит), воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря (цистит). Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): Бронхиальная астма, бронхоспазм или одышка, синдром лекарственной повышенной чувствительности. Ухудшение способности сердца перекачивать кровь (сердечная недостаточность), отеки конечностей (периферические отеки), риск тромботических осложнений (например, гибель части сердечной мышцы вследствие снижения ее кровоснабжения - инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт). Повышение артериального давления. Бронхиальная астма, бронхоспазм, одышка. Обострение воспалительных заболеваний кишечника (колита и болезни Крона), которое может проявляться болью в животе, частыми позывами или болью после опорожнения кишечника и другими признаками

нарушений пищеварения. Реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (синдром лекарственной гиперчувствительности - DRESS), проявляющийся кожной сыпью, повышением температуры тела, а также нарушением показателей крови острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP), симптомы включают образование гнойничков (пустулезная сыпь), отечных и покрасневших участков кожи преимущественно в складках кожи, на туловище и верхних конечностях реакции фоточувствительности. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас или у Вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы или Ваш ребенок приняли препарата Ибупрофен больше, чем следовало Если Вы или Ваш ребенок приняли слишком много капсул препарата Ибупрофен, немедленно обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. По возможности покажите врачу или медицинской сестре упаковку препарата Ибупрофен. Немедленно прекратите применение препарата и обратитесь за медицинской помощью, если у Вас или Вашего ребенка появились следующие симптомы: тошнота, рвота, боль в верхней части живота, реже диарея, шум в ушах, головная боль и желудочно-кишечное кровотечение. В более тяжелых случаях наблюдаются проявления со стороны центральной нервной системы: сонливость, редко - возбуждение, судороги, дезориентация, кома, острая почечная недостаточность, повреждение ткани печени, снижение артериального давления, угнетение дыхания и цианоз (синюшность кожного покрова). Если у вас бронхиальная астма, возможно обострение этого заболевания, проявляющееся приступом удушья.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или врачу Вашего ребенка или работнику аптеки о том, что Вы или Ваш ребенок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Избегайте одновременного применения ибупрофена со следующими лекарственными средствами: Ацетилсалициловая кислота: за

исключением низких доз ацетилсалициловой кислоты (не более 75 мг в сутки), назначенных врачом, поскольку совместное применение может повысить риск возникновения побочных эффектов. При одновременном применении ибупрофен снижает противовоспалительное и антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты (возможно повышение частоты развития острой коронарной недостаточности, если Вы или Ваш ребенок получаете в качестве антиагрегантного средства малые дозы ацетилсалициловой кислоты, после начала приема ибупрофена). Другие нестероидные противовоспалительные препараты, в том числе селективные ингибиторы ЦОГ-2 (циклооксигеназы-2): избегайте одновременного применения двух и более препаратов из группы нестероидных противовоспалительных препаратов из-за возможного увеличения риска возникновения побочных эффектов. С осторожностью применяйте ибупрофен одновременно со следующими лекарственными средствами: Антикоагулянты и тромболитические препараты: нестероидные противовоспалительные препараты могут усиливать эффект антикоагулянтов, в частности, варфарина и тромболитических препаратов. Антигипертензивные средства (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и антагонисты ангиотензина II) и диуретики: нестероидные противовоспалительные препараты могут снижать эффективность препаратов этих групп. Диуретики и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) могут повышать нефротоксичность нестероидных противовоспалительных препаратов. Глюкокортикостероиды: повышенный риск образования язв желудочно-кишечного тракта и желудочно-кишечные кровотечения. Антиагреганты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышенный риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения. Сердечные гликозиды: если Вы или Ваш ребенок одновременно принимаете нестероидные противовоспалительные препараты и сердечные гликозиды, это может привести к усугублению сердечной недостаточности, снижению скорости клубочковой фильтрации и увеличению концентрации сердечных гликозидов в плазме крови. Препараты лития: существуют данные о вероятности увеличения концентрации лития в плазме крови на фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов. Метотрексат: существуют данные о вероятности увеличения концентрации метотрексата в плазме крови на фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов. Циклоспорин: увеличивается риск нефротоксичности, если Вы или Ваш ребенок одновременно принимаете нестероидные противовоспалительные препараты и циклоспорин. Мифепристон: начинайте прием нестероидных противовоспалительных препаратов не ранее, чем через 8-12 дней после приема мифепристона, поскольку нестероидные противовоспалительные препараты могут снижать эффективность мифепристона. Такролимус: если Вы или Ваш ребенок принимаете одновременно нестероидные противовоспалительные препараты и такролимус, то возможно увеличение риска

нефротоксичности. Зидовудин: одновременное применение нестероидных противовоспалительных препаратов и зидовудина может привести к повышению гематотоксичности. Имеются данные о повышенном риске возникновения гемартроза и гематом у ВИЧ-положительных пациентов с гемофилией, получавших совместное лечение зидовудином и ибупрофеном. Антибиотики хинолонового ряда: если Вы или Ваш ребенок получаете совместное лечение нестероидными противовоспалительными препаратами и антибиотиками хинолонового ряда, возможно увеличение риска возникновения судорог. Цефамандол, цефоперазон, цефотетан, вальпроевая кислота, пликамицин: увеличение частоты развития гипопротромбинемии. Лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию: снижение выведения и повышение плазменной концентрации ибупрофена. Индукторы микросомального окисления (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты): увеличение продукции гидроксилированных активных метаболитов, увеличение риска развития тяжелых интоксикаций. Ингибиторы микросомального окисления: снижение риска гепатотоксического действия. Пероральные гипогликемические лекарственные средства и инсулин, производные сульфонилмочевины: усиление эффекта. Антациды и колестирамин: снижение абсорбции. Кофеин: усиление анальгезирующего эффекта. Препарат Ибупрофен с пищей и алкоголем Прием препарата вместе с пищей может замедлять его всасывание. Этанол повышает риск возникновения нежелательных реакций. Не употребляйте алкоголь во время курса лечения препаратом Ибупрофен.

Особые указания

Это особенно важно: Принимайте препарат максимально коротким курсом и в минимальной эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. Во время длительного лечения врач может назначать Вам или Вашему ребенку дополнительные анализы для оценки функционального состояния печени и почек, а также контроль картины периферической крови (крови, циркулирующей в сосудах). При появлении симптомов гастропатии (реакция слизистой желудка в ответ на применение некоторых препаратов) врач может назначить тщательный контроль, включающий проведение эзофагогастродуоденоскопии (обследование полости пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки), общий анализ крови (определение гемоглобина), анализ кала на скрытую кровь. Если у Вас или у Вашего ребенка есть нарушения в работе почек или серьезные заболевания почек, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата, поскольку существует риск ухудшения функционального состояния почек. Если у Вас или у Вашего ребенка гипертензия (повышенное кровяное давление) и/или хроническая сердечная недостаточность, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата, поскольку препарат

может вызывать задержку жидкости, повышение артериального давления и отеки. Если у Вас или у Вашего ребенка неконтролируемая артериальная гипертензия, застойная сердечная недостаточность II-III класса по NYHA, ишемическая болезнь сердца (нарушение кровоснабжения сердечной мышцы - миокарда), заболевания периферических артерий и/или цереброваскулярные заболевания (связанные с нарушением кровообращения головного мозга) применяйте ибупрофен только после тщательной оценки соотношения польза-риск с лечащим врачом, при этом избегайте применения высоких доз ибупрофена (более 2400 мг в сутки). Если Вы планируете беременность, примите во внимание, что препарат подавляет фермент циклооксигеназу (белковое соединение, участвующее в образовании гормонов и других веществ в организме) и синтез (образование сложных соединений из более простых) простагландинов (гормоны, вырабатываемые во всем организме, вызывающие родовую деятельность), воздействует на овуляцию, может нарушать женскую репродуктивную функцию (обратимо после отмены лечения). Если Вы или Ваш ребенок применяете нестероидные противовоспалительные препараты, болея ветряной оспой, то это может повысить риск развития тяжелых гнойных осложнений инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и подкожно-жировой клетчатки (например, некротизирующего фасциита). В связи с этим избегайте применения препарата при ветряной оспе. В очень редких случаях при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов возникают серьезные кожные реакции, в том числе эксфолиативный дерматит (покраснение кожи с образованием вялых пузырей, трансформирующихся в эрозии), синдром Стивенса-Джонсона (тяжелые кожные аллергические реакции) и токсический эпидермальный некролиз (тяжелые кожные аллергические реакции). Реакции в большинстве случаев могут возникнуть в течение первого месяца лечения. Немедленно прекратите применение препарата и обратитесь за медицинской помощью при первом появлении признаков и симптомов серьезных кожных реакций, таких как кожная сыпь, поражения слизистой оболочки или любых других признаков гиперчувствительности. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов, содержащих ибупрофен, может маскировать симптомы инфекционного заболевания (например, боль), что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Если Вы или Ваш ребенок принимаете Ибупрофен при повышении температуры тела или для облегчения боли при инфекции, проводите мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения обратитесь к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются. Дополнительные лабораторно-инструментальные исследования При необходимости определения 17-кетостероидов отмените препарат за 48 часов до исследования. Препарат Ибупрофен может повлиять на лабораторные и инструментальные данные, а именно: Может уменьшаться уровень гематокрита или гемоглобина Может

увеличиваться время кровотечения Может снижаться концентрация глюкозы в плазме крови Может уменьшаться клиренс креатинина Может увеличиваться плазменная концентрация креатинина Может повышаться активность «печеночных» трансаминаз. Дети Не давайте препарат детям в возрасте до 12 лет ввиду отсутствия данных об эффективности и безопасности (препарат противопоказан детям до 12 лет). Препарат Ибупрофен содержит краситель «Солнечный закат» желтый [E110] Краситель «Солнечный закат» желтый [E110] может вызывать аллергические реакции. Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. Препарат Ибупрофен может вызывать головокружение, сонливость, заторможенность или нарушения зрения (см. раздел «Побочные эффекты»). Если вы испытываете подобные нежелательные реакции, не управляйте транспортными средствами и не работайте с механизмами. Не разрешайте Вашему ребенку кататься на велосипеде, самокате и т. п., пока он принимает препарат.

Условия хранения

Храните препарат при температуре ниже 25 °C. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.