Инструкция по применению
Ихтиол Суппозитории 200 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ихтаммол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Описание

Суппозитории темно-коричневого цвета с характерным запахом, торпедообразной формы, с максимальным диаметром 1,2 см.

Действующее вещество

Ихтаммол

Состав

На один суппозиторий: Действующее вещество: Ихтиол (ихтаммол) - 0,2 г. Вспомогательные вещества: Вода очищенная - 0,038 г, Эмульгатор "Твердый - 2" (Т-2) - 0,05 г. Основа для суппозиториев Жир твердый (Витепсол (марки H 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) - до получения суппозитория массой 1,23 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Сальпингоофорит, эндометрит, простатит в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Ректально: по 1 суппозиторию 1-2 раза в день после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации препарат применяют с осторожностью, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 12 до 15 °С.