Инструкция по применению
Ихтиол Суппозитории ректальные 200мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ихтаммол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Суппозитории от зеленовато-коричневого до темно-коричневого цвета с запахом ихтиола, торпедообразной формы.

Действующее вещество

Ихтаммол

Состав

На один суппозиторий: Действующее вещество: ихтаммол (ихтиол) - 200 мг. Вспомогательные вещества: основа для суппозиториев: твердый жир, тип А - достаточное количество до получения суппозитория средней массой 1,23 г, допускается применение эмульгатора "Твердого - 2" (Т-2) в количестве 1-5% к массе основы.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

В связи с низкой абсорбцией ихтаммола, данные по фармакокинетике отсутствуют.

Показания

В составе комплексной терапии: в гинекологии - сальпингоофорит, эндометрит, в урологии - хронический простатит.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию 1-2 раза в день, после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника и проведения гигиенических процедур. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом индивидуально. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно, если потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата Ихтиол, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Нежелательные реакции (НР) сгруппированы в соответствии с поражением органов и систем органов согласно словарю MedDRA. Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Общие расстройства и нарушения в месте введения: ощущение жжения в месте введения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не совместим с растворами солей йода, алкалоидами, солями тяжелых металлов, оксидом цинка. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Ихтиол проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.