# Инструкция по применению
# Иммукор Гранулы гомеопатические 20 г

## Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: ДОКТОР Н
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1




## Описание

Однородные гранулы, правильной шаровидной формы, белого или белого с серым или кремовым оттенком цвета, без запаха.

## Действующее вещество

Гомеопатический состав

## Состав

На 100 г: активные компоненты: Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус) (аконитум)) С3, Bryonia (бриония) С3, Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белладонна) (белладонна)) С3, Baptisia tinctoria (Baptisia) (баптизия тинктория( (баптизия )) С3, Gelsemium sempervirens (Gelsemium)(гельземиум семпервиренс) (гельземиум)) С3, China rubra (хина рубра) С3, Allium сера (аллиум цепа) (цепа)) С3, Echinacea (эхинацея ) С6, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон кверсифолиум) (рус токсикодендрон)) С3, вспомогательные вещества: гранулы сахарные - 100 г.

## Форма выпуска

Гранулы

**Показания**

Лечение и предупреждение рецидивов ОРВИ с симптомокомплексом лихорадки, миалгией (болями в мышцах), интоксикацией, кашлем, насморком, болями и першением в горле.

**Способ применения и дозы**

Для взрослых: в первые дни заболевания по 7-9 гранул 5 раз в день под язык в первые 2-3 дня до снижения температуры, затем по 7-9 гранул 3 раза в день до 10-14 дня и по 7-9 гранул 2 раза в день до 28 дня. Для детей от 5 лет и старше: по 5-7 гранул 5 раз в день до купирования лихорадки, затем по 5-7 гранул 3 раза в день в течение 10-14 дней и по 5-7 гранул 2 раза в день до 28-го дня - противорецидивная терапия. Препарат принимают под язык до полного рассасывания за 30 минут до еды или через час после еды или в промежутках между приемами пищи.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Детский возраст до 5 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Не рекомендуется.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Возможно одновременное применение других лекарственных средств.

**Особые указания**

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3-5 дней приема, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции препарата, следует обратиться к врачу. Информация для больных сахарным диабетом - приём рекомендованной суточной дозы препарата в гранулах сахарных соответствует 0,13 хлебных единицы.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.