Инструкция по применению
Иммунал капли 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эхинацеи пурпурной травы сок
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20 мг
Срок годности: 24

Действующее вещество

Эхинацеи пурпурной травы сок

Состав

В 1 мл: Сок травы эхинацеи пурпурной 0.8 мл. Вспомогательные вещества: этанол, сорбитол.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Иммунал не предоставлены.

Показания

Для укрепления иммунитета при неосложненных острых инфекционных заболеваниях и при предрасположенности к частым простудным заболеваниям.Профилактика простудных заболеваний и гриппа.В качестве вспомогательного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

Способ применения и дозы

Препарат в форме раствора для приема внутрь назначают взрослым и подросткам старше 12 лет по 2.5 мл 3 раза/сут; детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1.5 мл 3 раза /сут; детям в возрасте от 1 года до 6 лет - по 1 мл 3 раза/сут. Препарат в форме таблеток назначают взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 таб. 3-4 раза/сут; детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1 таб. 1-3 раза/сут; детям в возрасте от 4 до 6 лет - по 1 таб. 1-2 раза/сут.Для достижения клинического эффекта Иммунал следует принимать не менее 1 недели. Продолжительность непрерывного приема - не более 8 недель. Таблетки следует запивать водой. Для маленьких детей рекомендуется растолочь таблетку и смешать с небольшим количеством воды, чая или сока. Для облегчения правильного дозирования раствора для приема внутрь в каждую упаковку вложена градуированная дозировочная пипетка. Перед приемом необходимое количество капель следует развести в небольшом объеме воды.

Противопоказания

Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция, СПИД); детский возраст до 12 лет; повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о негативном воздействии Иммунала отсутствуют. Перед применением препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактический шок, снижение АД, одышка.Прочие: лейкопения (при непрерывном применении более 8 недель).

Передозировка

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

Раствор для приема внутрь содержит этанол, в связи с чем препарат может усиливать или изменять эффект других лекарственных препаратов.Клинически значимое лекарственное взаимодействие отмечено при применении антибиотиков группы цефалоспоринов (цефамандол, цефотетан, цефменоксим, цефоперазон, моксалактам) и одновременном приеме этанола (даже в небольших количествах). Реакция пациента характеризовалась покраснением лица, тошнотой, повышенным потоотделением, головной болью, учащенным сердцебиением. В связи с этим Иммунал в форме раствора для приема внутрь не следует применять одновременно с вышеперечисленными антибиотиками. Прием Иммунала возможен только через 3 дня после окончания курса лечения указанными цефалоспоринами. При одновременном применении с иммунодепрессантами отмечается взаимное ослабление действия. Сообщения о каком-либо взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Перед применением препарата Иммунал у детей в возрасте до 12 лет и пациентов с аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой в анамнезе необходимо проконсультироваться у лечащего врача.В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата Иммунал и обратиться к врачу. Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Иммунал раствор для приема внутрь содержит 20% этанола (т.е. содержание спирта в максимальной разовой дозе эквивалентно 1 чайной ложке сухого вина). При хранении допустимо выпадение хлопьевидного осадка, состоящего из активных полисахаридов. Перед употреблением тщательно встряхнуть флакон. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей