Инструкция по применению
Иммунал плюс с раствор для внутреннего применения 50мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эхинацеи пурпурной травы сок
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 46.5 мг+20 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Эхинацеи пурпурной травы сок

Состав

В 1 мл: Высушенный сок травы эхинацеи пурпурной* 46.5 мг. Аскорбиновая кислота** 20 мг. Вспомогательные вещества: калия сорбат - 2 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, ароматизатор апельсиновый - 1.5 мг, мальтитол (жидкий) - 650 мг, натрия гидроксид - 1.6 мг, вода очищенная - 486.1 мг.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Иммунал не предоставлены.

Показания

Для укрепления иммунитета с целью: профилактики простудных заболеваний и гриппа; комплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения процесса выздоровления; также в качестве источника витамина С, необходимого при острых респираторных заболеваниях; при антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

Способ применения и дозы

Применять внутрь независимо от приема пищи.Дети старше 12 лет и взрослые: по 2-3-мл 3 раза/сут;Дети в возрасте от 4 до 12 лет: по 1-2 мл, 3 раза/сут;Дети в возрасте от 1 года до 4 лет: по 1 мл 3 раза\сут;Для достижения терапевтического эффекта Иммуналплюс С следует принимать в течение 7-10 дней. Повторные курсы возможны после 14-дневного перерыва.

Противопоказания

Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция, СПИД); детский возраст до 1 года (для раствора для приема внутрь); повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о негативном воздействии Иммунала отсутствуют. Перед применением препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдом Стивенса-Джонсона, анафилактический шок.

Передозировка

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследований по взаимодействию препаратов эхинацеи пурпурной с другими лекарственными препаратами не проводилось. При применении в рекомендованных дозах препарата Иммунал плюс С клинически значимые взаимодействия аскорбиновой кислоты и других лекарственных препаратов отсутствуют.

Особые указания

Перед применением препарата Иммунал плюс С пациентам с аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой и у детей до 12 лет необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата Иммунал плюс С и обратиться к врачу. При хранении допустимо выпадение хлопьевидного осадка, состоящего из активных полисахаридов. Перед употреблением тщательно встряхнуть флакон.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении