Инструкция по применению
Иммунал Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эхинацеи пурпурной травы сок
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 80 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Эхинацеи пурпурной травы сок

Состав

В 1 таблетке: Высушенный сок травы эхинацеи пурпурной 80 мг. Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, лактоза, магния стеарат, натрия сахаринат, ванилин, ароматизатор вишневый.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Иммунал не предоставлены.

Показания

Для укрепления иммунитета с целью: профилактики простудных заболеваний и гриппа; комплексного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта для ускорения процесса выздоровления; также в качестве источника витамина С, необходимого при острых респираторных заболеваниях; при антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

Способ применения и дозы

Препарат в форме таблеток назначают взрослым и подросткам старше 12 лет по 1 таб. 3-4 раза/сут; детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1 таб. 1-3 раза/сут; детям в возрасте от 4 до 6 лет - по 1 таб. 1-2 раза/сут.Для достижения клинического эффекта Иммунал следует принимать не менее 1 недели. Продолжительность непрерывного приема - не более 8 недель. Таблетки следует запивать водой. Для маленьких детей рекомендуется растолочь таблетку и смешать с небольшим количеством воды, чая или сока.

Противопоказания

Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания (туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция, СПИД); детский возраст до 1 года (для раствора для приема внутрь); повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о негативном воздействии Иммунала отсутствуют. Перед применением препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

В отдельных случаях возможно развитие реакций повышенной чувствительности: кожная сыпь, зуд, головокружение, бронхоспазм, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактический шок, снижение АД, одышка. Прочие: лейкопения (при непрерывном применении более 8 недель).

Передозировка

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое лекарственное взаимодействие отмечено при применении антибиотиков группы цефалоспоринов (цефамандол, цефотетан, цефменоксим, цефоперазон, моксалактам) и одновременном приеме этанола (даже в небольших количествах). Реакция пациента характеризовалась покраснением лица, тошнотой, повышенным потоотделением, головной болью, учащенным сердцебиением. В связи с этим Иммунал в форме раствора для приема внутрь не следует применять одновременно с вышеперечисленными антибиотиками. Прием Иммунала возможен только через 3 дня после окончания курса лечения указанными цефалоспоринами. При одновременном применении с иммунодепрессантами отмечается взаимное ослабление действия. Сообщения о каком-либо взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

С аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой в анамнезе необходимо проконсультироваться у лечащего врача. В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата Иммунал и обратиться к врачу. Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Условия хранения

Беречь от детей