Инструкция по применению
Иммунокинд Таблетки для рассасывания для детей гомеопатические 150 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60.0

Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 мгCalcium fluoratum D6 20 мгCalcium phosphoricum D6 20 мгSulfur jodatum D12 20 мгАктивный компонент получен методом твердофазного потенциирования с использованием лактозы моногидрата.
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 14.85 мг, тальк - 5 мг, магния стеарат - 0.15 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучена.

Показания

— профилактика ОРЗ, ускорение процессов выздоровления и повышение сопротивляемости организма к респираторным инфекциям у часто болеющих детей в возрасте до 6 лет.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Иммунокинд следует принимать следующим образом: дети от 0 до 6 лет - по 1 таб. 3 раза/сут.Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. При лечении грудных детей и детей до 3-х лет таблетку следует тщательно измельчить в 5 мл (1 чайная ложка) воды и полученную суспензию дать ребенку выпить. Длительность применения лекарственного препарата составляет 21 день. При отсутствии улучшения или при появлении нежелательных явлений следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата — дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью — детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не предназначен для применения при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

До настоящего времени побочные эффекты не известны. Возможны аллергические реакции.Если вы заметили, что у вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Иммунокинд, сообщите об этом вашему врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не известны.Если ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие медикаменты, в т.ч. и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом вашему врачу.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных препаратов может отмечаться временное обострение симптомов и в этом случае следует обратиться к врачу.Для пациентов, страдающих сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (6 таблеток) соответствует 0.041 хлебной единицы (ХЕ). Следует соблюдать особую осторожность при применении препарата у детей грудного и младшего возраста (до 3 лет).

Условия хранения

В сухом месте