Инструкция по применению
Имудон Таблетки для рассасывания 24 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лизаты микроорганизмов [Candida albicans+Corynebacterium pseudodiphtheriticum+Enterococcus faecalis+Enterococcus faecium+Fusobacterium nucleatum subsp
Количество в упаковке: 24
Дозировка действующего вещества: 2,7 мг
Срок годности: 24

Описание

Имудон® - лекарственное средство на основе лизатов бактерий. Выпускается в форме таблеток для рассасывания с мятным вкусом. Имудон® можно применять взрослым и детям с 3-х лет. Активирует фагоцитоз, способствует увеличению количества иммунокомпетентных клеток, повышает выработку лизоцима и интерферона, иммуноглобулина А в слюне. Имеет широкий спектр показаний. Назначается для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: фарингит, хронический тонзиллит, при предоперационной подготовке и послеоперационного периода после тонзилэктомии. Препарат показан при поверхностных и глубоких пародонтозах, парадонтите, стоматите, глоссите, гингивите. Также Имудон® можно применять при дисбактериозе полости рта, инфекциях после удаления зубов, имплантаций искусственных зубных корней, изъязвлениях, вызванных зубными протезами*. * Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Имудон® таблетки для рассасывания, П N014990/01

Действующее вещество

Лизаты микроорганизмов [Candida albicans+Corynebacterium pseudodiphtheriticum+Enterococcus faecalis+Enterococcus faecium+Fusobacterium nucleatum subsp

Состав

Смесь лизатов бактерий, концентрация действующего вещества (мг): 2.7

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Нет данных.

Показания

фарингит и хронический тонзиллит; предоперационная подготовка и послеоперационный период после тонзиллэктомии; поверхностные и глубокие пародонтозы, пародонтит, стоматит (в том числе афтозный), глоссит; эритематозный и язвенный гингивит; дисбактериоз полости рта; инфекции после удаления зубов, имплантаций искусственных зубных корней; изъязвления, вызванные зубными протезами.

Способ применения и дозы

При лечении острых воспалительных заболеваний полости рта и глотки и обострении хронических заболеваний принимают по 8 таблеток в сутки. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в полости рта с интервалом 1–2 час. Средняя продолжительность курса лечения - 10 дней.

Применение при беременности и кормлении грудью

Информация об использовании Имудона у беременных женщин недостаточна. Соответствующие данные экспериментов на животных и эпидемиологические исследования отсутствуют. Не рекомендуется принимать Имудон в период беременности или лактации.

Побочные действия

сыпь, крапивница, ангионевротический отек, боль в желудке, тошнота и рвота.

Передозировка

Случаев передозировки Имудона не описано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечено. Имудон может быть использован с лекарственными препаратами других групп.

Особые указания

Дети от 3-х до 6 лет рассасывают таблетки под обязательным присмотром взрослых! Не следует принимать пищу и воду, а также полоскать рот в течение часа после применения Имудона, чтобы не снижать терапевтическую эффективность препарата. При назначении препарата пациентам, соблюдающим бессолевую или малосоленую диету, необходимо учитывать, что 1 таблетка Имудона содержит 15 мг Na. Больным бронхиальной астмой, у которых прием препаратов, содержащих бактериальные лизаты, вызывает обострение заболевания (приступ бронхиальной астмы), применять препарат не рекомендуется.

Условия хранения

Беречь от детей