Инструкция по применению
Имудон Таблетки для рассасывания 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лизаты микроорганизмов [Candida albicans+Corynebacterium pseudodiphtheriticum+Enterococcus faecalis+Enterococcus faecium+Fusobacterium nucleatum subsp
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 2.7 мг
Срок годности: 24

Описание

Имудон® - лекарственное средство на основе лизатов бактерий. Выпускается в форме таблеток для рассасывания с мятным вкусом. Имудон® можно применять взрослым и детям с 3-х лет. Активирует фагоцитоз, способствует увеличению количества иммунокомпетентных клеток, повышает выработку лизоцима и интерферона, иммуноглобулина А в слюне. Имеет широкий спектр показаний. Назначается для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: фарингит, хронический тонзиллит, при предоперационной подготовке и послеоперационного периода после тонзилэктомии. Препарат показан при поверхностных и глубоких пародонтозах, парадонтите, стоматите, глоссите, гингивите. Также Имудон® можно применять при дисбактериозе полости рта, инфекциях после удаления зубов, имплантаций искусственных зубных корней, изъязвлениях, вызванных зубными протезами*. * Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Имудон® таблетки для рассасывания, П N014990/01

Действующее вещество

Лизаты микроорганизмов [Candida albicans+Corynebacterium pseudodiphtheriticum+Enterococcus faecalis+Enterococcus faecium+Fusobacterium nucleatum subsp

Состав

Смесь лизатов бактерий, концентрация действующего вещества (мг): 2.7

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Препарат преимущественно действует в полости рта, в настоящее время отсутствуют данные о системной абсорбции.

Показания

Фарингит и хронический тонзиллит предоперационная подготовка и послеоперационный период после тонзиллэктомии поверхностные и глубокие пародонтозы, пародонтит, стоматит (в том числе афтозный), глоссит эритематозный и язвенный гингивит дисбактериоз полости рта инфекции после удаления зубов, имплантаций искусственных зубных корней изъязвления, вызванные зубными протезами

Способ применения и дозы

При лечении острых воспалительных заболеваний полости рта, глотки и обострении хронических заболеваний принимают по 8 таблеток в сутки. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в полости рта с интервалом 1 – 2 часа. Средняя продолжительность курса лечения - 10 дней.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к препарату или его компонентам детский возраст до 3-х лет аутоиммунные заболевания

Применение при беременности и кормлении грудью

Информация об использовании Имудона при беременности недостаточна. Соответствующие данные экспериментов на животных и эпидемиологические исследования отсутствуют. Не рекомендуется принимать Имудон при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

сыпь крапивница ангионевротический отек боль в желудке тошнота и рвота

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Имудон не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие не отмечено. Имудон можно применять одновременно с другими лекарственными препаратами.

Особые указания

Не следует принимать пищу и воду, а также полоскать рот в течение 1 ч после применения Имудона, чтобы не снижать терапевтическую эффективность препарата. При назначении препарата пациентам, соблюдающим бессолевую или малосолевую диету, необходимо учитывать, что 1 таб. Имудона содержит 15 мг натрия. Пациентам с бронхиальной астмой, у которых прием препаратов, содержащих бактериальные лизаты, вызывает обострение заболевания (приступ бронхиальной астмы), применять препарат не рекомендуется. Использование в педиатрии Дети в возрасте от 3 до 6 лет должны рассасывать таблетки под наблюдением взрослых.<.p>Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Нет данных, свидетельствующих о необходимости каких-либо ограничений деятельности, связанной с управлением автомобилем или другими механизмами в период лечения.

Условия хранения

Беречь от детей