Инструкция по применению
Индигал Капсулы 120 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Алцея
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 24.0



Описание

«ИНДИГАЛ» в капсулах по 400 мг Фармакологические свойства Активные вещества Индигала обладают антиандрогенным, антипролиферативным и антиоксидантным действием. В отличие от стандартных антиандрогенных препаратов, негативно влияющих на половые функции мужчины, эффект со стороны Индигала основан на снижении активности андрогеновых рецепторов, которое осуществляется на молекулярном уровне. Поэтому Индигал не имеет отрицательного влияния на сексуальные функции мужчины. Индигал тормозит патологический рост кровеносных сосудов, сопровождающий клеточную гиперпролиферацию и, таким образом, препятствует росту новообразований. Компоненты Индигала с антиандрогенным и антипролиферативным действием обеспечивают профилактический эффект в отношении рака предстательной железы. Индигал рекомендован для использования в качестве средства химиопрофилактики рака предстательной железы у пациентов с повышенным уровнем простатического специфического антигена (ПСА), в том числе в составе комплексной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГЖП), а также у пациентов с простатической интраэпителиальной неоплазией (ПИН). Информация об эффективности БАД, вынесенная в рекомендацию по применению и на этикетку, подтверждена клиническими испытаниями на основании Акта клинических испытаний ФГУ «НИИ урологии Росмедтехнологий» №005 от 10.03.2009 г.

Состав

СОСТАВ на 1 капсулу 400 мг Лактозы моногидрат (248,0 мг); индол-3-карбинол (экстракт растений семейства крестоцветных) (100,0 мг); капсула (желатин, вода) (76,0 мг); экстракт зеленого чая (50,0 мг); магния стеарат (2,0 мг). Не содержит ГМО.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. В суточной дозировке (2 капсулы) содержится % от адекватной суточной потребности: 360 % индол-3-карбинола и 70 % эпигаллокатехин-3-галлата. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Побочные действия

По данным доклинического и клинического изучения препарата, Индигал хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте