Инструкция по применению
Индинол Форто Капсулы 200 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МираксБиоФарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Индолкарбинол
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 2

Описание

Капсулы целлюлозные № 0 с корпусом белого цвета и крышкой оранжевого цвета. Содержимое капсулы - порошок от белого до светло-желтого или светло-коричневого цвета, со слабым специфическим запахом.

Действующее вещество

Индолкарбинол

Состав

1 капсула содержит: Действующее вещество: Индолкарбинол (интринол) - 0,200 г. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 0,110 г, крахмал кукурузный модифицированный - 0,095 г, целлюлоза микрокристаллическая - 0,064 г, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят) - 0,030 г, магния стеарат - 0,001 г. Состав капсулы: гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромелоза) - до 100 %, вода очищенная - 4-6 %. Красители: корпус капсулы: титана диоксид, Е 171 - 2,113 % Красители: крышка капсулы: краситель солнечный закат желтый, Е 110 - 0,136 %, титана диоксид, Е 171 - 2,437 %.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Циклическая масталгия, в том числе на фоне доброкачественной гиперплазии молочной железы.

Способ применения и дозы

Внутрь, 2 раза в сутки по 200 мг. Суточная доза препарата составляет 400 мг. Капсулы принимают перед едой. Длительность курса лечения 6 месяцев.

Противопоказания

Применение препарата противопоказано при наличии любого из перечисленных ниже состояний: Повышенная чувствительность к индолкарбинолу или любому из вспомогательных веществ препарата. Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. Период беременности и грудного вскармливания Детский возраст до 18 лет. Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Противопоказано применение препарата Индинол® Форто в период беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Нарушения со стороны половых органов и молочной железы: нарушения менструального цикла в виде удлинения или укорочения. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в эпигастрии Лабораторные и инструментальные данные: повышение концентрации тиреотропного и фолликулостимулирующего гормонов, пролактина и эстрадиола, снижение концентрации креатинина, эозинофилия. Нарушения со стороны обмена веществ и питания: снижение массы тела. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций (НР) усугубляются, или Вы заметили любые другие НР, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

К возможным симптомам передозировки относится тошнота, рвота, диарея. Специфический антидот неизвестен. При подозрении на передозировку Индинола® Форто рекомендуется симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Индолкарбинол влияет на активность изоферментов цитохрома Р450, поэтому следует соблюдать осторожность при совместном применении с лекарственными препаратами, в метаболизме которых участвуют изоферменты цитохрома Р450 (непрямые антикоагулянты, глюкокортикостероиды, пероральные гипогликемические средства, антиаритмические, противоэпилептические, препараты наперстянки, препараты половых гормонов), так как может потребоваться коррекция их дозы.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Исходя из особенностей фармакодинамики и профиля нежелательных эффектов, маловероятно, что Индинол® Форто оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.