Инструкция по применению
Индинол Капсулы 325 мг 120 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МираксБиоФарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 120
Срок годности: 24.0



Описание

Биологически активная добавка к пище Индинол® в капсулах по 325 мг содержит индол-3-карбинол растительного происхождения, универсальный корректор патологических гиперпластических процессов в органах и тканях женской репродуктивной системы (молочной железе, эндометрии, миометрии, шейке матки, яичниках). Индол-3-карбинол, в составе БАД Индинол® , может помочь нормализовать баланс эстрогенов в организме и подавить их негативное стимулирующее влияние. Индол-3-карбинол обладает защитным действием на гормон-чувствительные ткани, такие как молочная железа, матка, шейка матки, эндометрий и другие гормон-зависимые ткани. БАД Индинол® может быть рекомендован с целью коррекции диеты, в том числе женщинам с   фиброзно-кистозной мастопатией с целью поддержки функционального состояния молочных желез. Перед приемом БАД обязательно проконсультируйтесь со специалистом.БАД. Не является лекарственным средством.

Состав

Лактоза, индол-3-карбинол, капсула желатиновая (желатин, красители: оксид железа красный E172, азорубин E122), агенты антислёживающие: магниевые соли жирных кислот (магния стеарат) E470(b), диоксид кремния аморфный E551. Содержит краситель (E122), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Не содержит ГМО.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

\\\\- для профилактики фиброзно-кистозной мастопатии и в составе ее комплексного лечения, а также для коррекции функциональных состояний молочных желез, обусловленных данной патологией; \\\\- в сочетании с БАД Эпигаллат® в комплексном терапевтическом лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия без атипии, а также для профилактики рецидивов указанных заболеваний после хирургического лечения; \\\\- при комплексном лечении заболеваний генитальной сферы у женщин, ассоциированных с вирусом папилломы человека: дисплазии шейки матки (внутриэпителиальной цервикальной неоплазии), аногенитальном кондиломатозе.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. В суточной дозировке (3 капсулы) содержится не менее 270 мг индол-3-карбинола. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, кормление грудью, при приеме препаратов, снижающих кислотность желудочного сока.

Побочные действия

По данным доклинического и клинического изучения препарата, Индинол® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

Взаимодействие с другими препаратами

ИНДИНОЛ® в комплексном применении с препаратом ЭПИГАЛЛАТ® способствует торможению роста миомы матки, гиперплазии эндометрия, уменьшению очагов эндометриоза, предотвращению повторного развития заболеваний после хирургического лечения и гормональной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте