Инструкция по применению
Индинол Капсулы 325 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Алцея
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24.0

Описание

Биологически активная добавка к пище Индинол® в капсулах по 325 мг содержит индол-3-карбинол растительного происхождения, универсальный корректор патологических гиперпластических процессов в органах и тканях женской репродуктивной системы (молочной железе, эндометрии, миометрии, шейке матки, яичниках). Индол-3-карбинол, в составе БАД Индинол® , может помочь нормализовать баланс эстрогенов в организме и подавить их негативное стимулирующее влияние. Индол-3-карбинол обладает защитным действием на гормон-чувствительные ткани, такие как молочная железа, матка, шейка матки, эндометрий и другие гормон-зависимые ткани. БАД Индинол® может быть рекомендован с целью коррекции диеты, в том числе женщинам с   фиброзно-кистозной мастопатией с целью поддержки функционального состояния молочных желез. Перед приемом БАД обязательно проконсультируйтесь со специалистом.БАД. Не является лекарственным средством.

Состав

Лактоза, индол-3-карбинол, капсула желатиновая (желатин, красители: оксид железа красный E172, азорубин E122), агенты антислёживающие: магниевые соли жирных кислот (магния стеарат) E470(b), диоксид кремния аморфный E551. Содержит краситель (E122), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Не содержит ГМО. БАД к пище обладает специфическим запахом*, характерным для используемого сырья, с различной степенью интенсивности - от слабого до выраженного. * Запах может восприниматься каждым потребителем индивидуально.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

для профилактики фиброзно-кистозной мастопатии и в составе ее комплексного лечения, а также для коррекции функциональных состояний молочных желез, обусловленных данной патологией; в сочетании с БАД Эпигаллат® в комплексном терапевтическом лечении эндометриоза, аденомиоза, миомы матки и гиперплазии эндометрия без атипии, а также для профилактики рецидивов указанных заболеваний после хирургического лечения; при комплексном лечении заболеваний генитальной сферы у женщин, ассоциированных с вирусом папилломы человека: дисплазии шейки матки (внутриэпителиальной цервикальной неоплазии), аногенитальном кондиломатозе.

Способ применения и дозы

В составе комбинированной терапии (гиперплазия эндометрия без атипии, эндометриоз, аденомиоз, миома матки) Индинол® рекомендуется принимать внутрь в сочетании с БАД Эпигаллат® (1 капсула +1 капсула) 3 раза во время еды в течение 2-3 недель. При необходимости прием можно повторить. При заболеваниях генитальной сферы, ассоциированных с вирусом папилломы человека, Индинол® рекомендуется принимать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день в сочетании с препаратами - иммуномодуляторами, используемыми в качестве стандартного лечения данных заболеваний. При этом курс лечения необходимо проходить обоим половым партнерам.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, кормление грудью, при приеме препаратов, снижающих кислотность желудочного сока.

Побочные действия

По данным доклинического и клинического изучения препарата, Индинол® хорошо переносится, не оказывая в терапевтических дозах побочных эффектов.

Взаимодействие с другими препаратами

ИНДИНОЛ® в комплексном применении с препаратом ЭПИГАЛЛАТ® способствует торможению роста миомы матки, гиперплазии эндометрия, уменьшению очагов эндометриоза, предотвращению повторного развития заболеваний после хирургического лечения и гормональной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте