Инструкция по применению
Индометацин мазь 10% 40 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Болгария
Производитель: Борисовский Завод Медицинских Препаратов
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Индометацин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%



Действующее вещество

Индометацин

Состав

в 100 г мази:активное вещество: индометацин 10 гвспомогательные вещества: ланолин — 17,5 г; вазелин — 52,45 г; диметилсульфоксид — 15 г; воск пчелиный желтый — 2 г; кремния диоксид коллоидный — 3 г; лаванды масло — 0,05 г

Форма выпуска

Мазь

Показания

Ревматойдный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагрический артрит, псориатический артрит, остеохондроз с корешковым синдромом. Травматически обусловленное воспаление мягких тканей и опорно - двигательного аппарата (растяжения, вывихи, ушибы). Невралгии и миалгии различного генеза. Препарат показан для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ применения и дозы

наружно, мазь втирают легкими движениями, тонким слоем в кожу болезненных участков тела по 2 - 3 см. (1 - 1,5 гр.) 2 - 3 раза в день. Общее количество для взрослых в сутки не должно превышать 15 см., выдавливаемых из тубы, для детей старше 14 лет - 7,5 см. Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней.

Противопоказания

Суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра);Травматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата; Невралгии, миалгии;Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влиет.

Побочные действия

Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение). Системные реакции: генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции (крапивница

Передозировка

Крайне низкая системная абсорбция активных компонентов препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.Однако, при случайном применении больших количеств мази, возможно появление нежелательных реакций: тошнота, рвота, сильная головная боль, головокружения, нарушения памяти и дезориентация. В более тяжелых случаях наблюдаются парестезии, онемение конечностей и судороги.При случайном проглатывании больших количеств препарата возможно развитие системных побочных эффектов.Лечение включает быстрое выведение препарата из организма и применение соответствующих симптоматических средств. Индометацин нельзя вывести из организма посредством гемодиализа.

Взаимодействие с другими препаратами

Эффект Индометацина усиливается при его комбинации с глюкокортикостероидами и производными пиразолона. Может усиливать действие препаратов вызывающих фотосенсибилизацию.

Особые указания

Мазь следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегать попадания в глаза или на слизистые оболочки.