# Инструкция по применению
# Инфлюцид Таблетки для рассасывания гомеопатические 60 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 36.0




## Описание

Инфлюцид таблетки гомеопатические оказывают противовоспалительное, жаропонижающее, отхаркивающее и муколитическое действие.

## Действующее вещество

Гомеопатический состав

## Состав

Aconitum D3 - 25 мг, Gelsemium D3 - 25 мг, Ipecacuanha D3 - 25 мг, Phosphorus D5 - 25 мг, Bryonia D2 - 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 - 25 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

## Форма выпуска

Таблетки

## Показания

Профилактика и лечение гриппа и других ОРВИ.

**Способ применения и дозы**

При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления. Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз /сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления. Препарат в форме раствора для приема внутрь при острых заболеваниях назначают по 10 капель каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 10-20 капель 3 раза/сут до полного выздоровления. Для профилактики ОРВИ детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 2 раза/сут, детям от 6 до 12 лет - по 1 таб. 2 раза/сут, взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут. Для профилактики ОРВИ препарат в форме раствора для приема внутрь назначают взрослым и детям старше 12 лет по 10-20 капель 3 раза /сут. Препарат следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи. Таблетки следует медленно рассасывать во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата Инфлюцид при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

**Побочные действия**

Возможны: аллергические реакции.

**Особые указания**

При применении Инфлюцида возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При применении Инфлюцида допускается использование других лекарственных препаратов. Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия улучшения при остром заболевании через 2 дня, препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом. Прием препарата Инфлюцид в форме таблеток может оказывать отрицательное влияние на пациентов с целиакией и непереносимостью лактозы. Таким пациентам рекомендуется принимать препарат в форме раствора для приема внутрь.

**Условия хранения**

При комнатной температуре