Инструкция по применению
Инфлюцид Таблетки для рассасывания гомеопатические 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 40

Описание

Инфлюцид таблетки гомеопатические оказывают противовоспалительное, жаропонижающее, отхаркивающее и муколитическое действие.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Aconitum D3 - 25 мг, Gelsemium D3 - 25 мг, Ipecacuanha D3 - 25 мг, Phosphorus D5 - 25 мг, Bryonia D2 - 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 - 25 мг.Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Препарат Цефиксим ЭКСПРЕСС показан к применению у взрослых и детей с массой тела более 25 кг для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами: стрептококковый тонзиллит (инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками, поражающее ротоглотку) и фарингит (воспалительное заболевание глотки) – синуситы (воспаление слизистой оболочки носа) – острый бронхит (воспалительный процесс в бронхах) – обострение хронического бронхита (длительный воспалительный процесс в слизистых оболочках бронхов) – острый средний отит (воспаление среднего уха) – неосложненные инфекции мочевыводящих путей – неосложненная гонорея (инфекционное заболевание, вызываемое гонококком, поражающее слизистую оболочку половых органов) шигеллез (инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода шигелл, поражающее толстый кишечник).Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз /сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.Препарат в форме раствора для приема внутрь при острых заболеваниях назначают по 10 капель каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 10-20 капель 3 раза/сут до полного выздоровления.Для профилактики ОРВИ детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 2 раза/сут, детям от 6 до 12 лет - по 1 таб. 2 раза/сут, взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут.Для профилактики ОРВИ препарат в форме раствора для приема внутрь назначают взрослым и детям старше 12 лет по 10-20 капель 3 раза /сут.Препарат следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи. Таблетки следует медленно рассасывать во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Инфлюцид при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны: аллергические реакции.

Особые указания

При применении Инфлюцида возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.При применении Инфлюцида допускается использование других лекарственных препаратов.Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия улучшения при остром заболевании через 2 дня, препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом.Прием препарата Инфлюцид в форме таблеток может оказывать отрицательное влияние на пациентов с целиакией и непереносимостью лактозы. Таким пациентам рекомендуется принимать препарат в форме раствора для приема внутрь.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.