Инструкция по применению
Инфорте Капсулы 300 мг 12 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Китайская Народная Республика
Производитель: Meizhou Hengrun Biology Industry
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 12

Описание

Оказывает общеукрепляющее и мягкое тонизирующее действие, способствует улучшению половой функции у мужчин различных возрастных групп.Рекомендуемая суточная дозировка (1 капсула) содержит:Флавоноиды в пересчёте на рутин, не менее 8 мгОрганические кислоты, включая пориевую 25 мгГинзенозиды (панаксозиды), не более 30 мг Ямс китайский. Повышает количество андрогенов, отвечающих за активную половую жизнь мужчины, оказывает общеукрепляющий эффект на весь организм. Горянка крупноцветковая. Содержит эпимедиум, который блокирует выработку фермента, ограничивающего приток крови к половому члену. Обладает способностью освобождения тестостерона, улучшает спермопродуцирование и повышает половое влечение. Корень женьшеня. Содержит эфирное и жирные масла, пектины, гликозиды, сапонины. Помогает при ослаблении половой функции. Укрепляет сердечно-сосудистую систему, за счет чего существенно усиливается приток крови к половому члену. Воздействуя на гипоталамус - стимулирует выработку главного мужского гормона (тестостерона). Пория кокосовидная. Содержит тетрациклические тритерпеновые кислоты, пахимовую кислоту, полисахариды, фитостероиды, ферменты. Повышает сексуальное влечение, способствует преодолению эректильной дисфункции.

Состав

Состав (в 1 капсуле): корневища ямса китайского -142,29 мг (47,26 %), трава горянки крупноцветковой - 86,02 мг (28 57%), корень женьшеня - 40,03 мг (14,29%), пория кокосовидная - 28,66 мг (9,52 %, желатин, Е171 (краситель).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище - источника гинзенозидов и флавоноидов, содержащей органические кислоты, в том числе пориевую кислоту.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды или же за 2-3 часа до полового акта.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенное артериальное давление, выраженный атеросклероз, повышенная нервная возбудимость, прием в вечернее время.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано в период беременности и лактации.

Особые указания

При наличии выраженного атеросклероза и повышенного артериального давления рекомендуется консультация с врачом.

Условия хранения

В сухом месте