Инструкция по применению
Ингалипт спрей 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Дав Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев мас
ло+Сульфаниламид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалипт
овое масло
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Сульфаниламид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалиптовое масло

Состав

В 100 мл препарата содержится: Активные компоненты: Стрептоцида растворимого 2,5 г, сульфатиазола натрия 2,5 г, тимола 0,05 г, эвкалиптового масла 0,05 г, мяты перечной масла 0,05 г. Вспомогательные вещества: Этилового спирта 95% (этанол) 6,0 г, сахара белого (сахарозы) 5,0 г, глицерина (глицерол) 7,0 г, твина-80 (полисорбат-80) 3,0 г, воды очищенной до 100 мл.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Препарат образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламид натрия и сульфатиазол натрия. Оба препарата обратно связываются с белками крови: сульфаниламид натрия на 12-14% сульфатиазол натрия на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения сульфаниламида натрия составляет 10 час. сульфатиазола натрия -12 час.

Показания

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания полости рта гортани и носоглотки: тонзиллит фарингит афтозный и язвенный стоматит.

Способ применения и дозы

Перед орошением рот и глотку прополаскивают теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы эрозии) с помощью тампонов удаляют некротический налет. Устанавливают направляющую трубку под углом 90° к флакону. Конец трубки вводят в полость рта и нажимают на распылительную насадку 3-4 раза направляя поток жидкости на обрабатываемые участки. Орошение производят 4-5 раз в сутки через 2-3 часа. Во избежание засорения распылительную насадку с направляющей трубкой рекомендуется после применения продуть или промыть кипяченой водой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость сульфаниламидов эфирных масел или других компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты препарата кратковременное ощущение жжения или першения.

Передозировка

Симптомы: тошнота рвота связанные с заглатыванием части препарата. Лечение: специфический антидот отсутствует симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Системные эффекты при использовании препарата по назначению маловероятны что позволяет одновременно применять другие лекарственные средства без опасности их взаимодействия с компонентами препарата.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей старше 3-х лет возможно только по рекомендации врача. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 5° С до 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.