Инструкция по применению
Ингалипт Аэрозоль 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Аэрозоль
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Сульфаниламид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалиптовое масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Сульфаниламид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалиптовое масло

Состав

Действующие вещества: месульфамид натрия (стрептоцид растворимый)− 0,750 г, сульфатиазол натрия пентагидрат − 0,750 г, эвкалипта шарикового листьев масло − 0,015 г, мяты перечной листьев масло − 0,015 г, Тимол − 0,015 г. Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 95 %- 1,800 г. сахароза − 1,500 г. Глицерол (глицерин) − 2,100 г. полисорбат-80 − 0,900 г. вода очищенная − до 30 мл. азот − от 0,300 до 0,400 г.

Форма выпуска

Аэрозоль

Фармакокинетика

Препарат образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Частично всасываются сульфаниламидные препараты, которые связываются с белками крови: стрептоцид растворимый на 12-14 %, сульфатиазол натрия на 55 %. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы препаратов, в виде которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида составляет 10 ч., сульфатиазола натрия – 1-2 ч.

Показания

Острые и хронические воспалительные заболевания носоглотки и поражения слизистой оболочки полости рта.

Способ применения и дозы

Местно. Сняв предохранительный колпачок с флакона и надев прилагаемый распылитель, распыляют взвесь в полость рта 1-2 секунды. Препарат удерживают в полости рта 5-7 минут. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой. Во избежание закупорки отверстия распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. При использовании баллон следует держать строго вертикально. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 3 лет), беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата Ингалипт при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, которые проникают через плаценту и обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия. При необходимости использования препарата в период грудного вскармливания необходимо прекратить грудное вскармливание, т.к. сульфаниламиды проникают в грудное молоко и могут вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Побочные действия

Аллергические реакции (высыпания на коже, зуд), кратковременное ощущение жжения или першения в горле. При проявлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата. Лечение: специфический антидот отсутствует, симптоматическая и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют. Возможно одновременное применение с другими местными противомикробными средствами с целью расширения спектра действия и повышения эффективности.

Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача. При приеме более 2 недель может вызвать поражение зубов. Содержание этанола в разовой дозе – 10 мг, в суточной дозе – 40 мг (в пересчете на абсолютный спирт). Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 30С. Хранить в недоступном для детей месте.