Инструкция по применению
Armed Ингалятор-небулайзер 403D

Характеристики

Форма выпуска: Ингалятор
Страна: Германия
Производитель: Бейджинг Форнерс Медикал Эквипмент
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Ингалятор-небулайзер «Armed», вариант исполнения 403D.Ингалятор-небулайзер «Armed» предназначен для проведения аэрозольной ингаляционной терапии в медицинских учреждениях и на дому, для получения аэрозолей водорастворимых лекарственных препаратов (антибиотиков, минеральных вод и т.д.) с целью лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких. Может использоваться в домашних условиях и в лечебно-профилактических учреждениях, производя мелкодисперсный аэрозоль и пригоден для ингаляции препаратами на водной основе. Ингалятор компрессорного типа. В процессе лечения сохраняются все свойства лекарственных препаратов, они экономно расходуются и равномерно дозируются. В комплекте имеется удобный ротовой мундштук, обеспечивающий высокую концентрацию лекарственного вещества и его доставку даже в нижние отделы дыхательных путей. Благодаря компактным размерам и удобной ручкой на корпусе устройство легко перемещать, хранить и размещать на любой поверхности для проведения процедуры. Специальное крепление для мундштука на корпусе обеспечивает высокий уровень гигиены в процессе ингаляции. Аппарат оснащен сменным воздушным фильтром.Технические характеристикиРазмер (± 5%) - 175*175*110 ммНапряжение сети - 198-242 ВРежим работы/паузы - 30/30 минСкорость распыления (производительность), не менее - 0.1 мл/минМаксимальный воздушный поток, не менее - 10 л/минУровень шума - 60 дБПотребляемая мощность, не более - 130 ВтРабочее давление компрессора - 150 кПаМаксимальный объём раствора - 6 млПоказания Бронхиальная астма, в частности при тяжелом обострении, при тяжелой хронической и нестабильной форме и при стероидозависимой

бронхиальной астме. При хронической обструктивной болезни легких, во время обострения и при далеко зашедших стадиях заболевания. При муковисцидозе, а также при бронхоэктазах с хронической колонизацией синегнойной палочки, у - ВИЧ-инфицированных для профилактики пневмонии и при грибковых заболеваниях легких. В интенсивной терапии, для терапии вирусного бронхиолита у детей, бронхолегочной дисплазии у новорожденных, респираторного дистресс-синдрома взрослых и детей, высокой легочной гипертензии у больных с дыхательной недостаточностью. При терапии первичной легочной гипертензии. При паллиативной терапии, для уменьшения рефрактерного кашля, инкурабельной одышки, задержки бронхиального секрета, бронхиальной обструкции, а также у пациентов с плохой и хорошей координацией вдоха с активацией ингалятора, независимо от величины создаваемого инспираторного потока.В случаях если лекарственное вещество не может быть доставлено в дыхательные пути при помощи других ингаляторов, т.к. существует достаточно много лекарственных препаратов, для которых не создано портативных ингаляторов: антибиотики, муколитики, препараты сурфактанта, простаноиды и др.Особо актуальным небулайзер является в случаях отсутствия возможности принимать лекарственные препараты в таблетированной или суспезионной форме.Небулайзер в упаковке завода-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от - 40 до + 55 ?С, относительной влажности не более 95% и атмосферном давлении от 0,05 до 0,106 МПа.

Состав

Материал - Пластик

Форма выпуска

Ингалятор

Показания

Ингалятор-небулайзер «Armed» предназначен для проведения аэрозольной ингаляционной терапии в медицинских учреждениях ина дому, для получения аэрозолей водорастворимых лекарственных препаратов (антибиотиков, минеральных вод и т.д.) с целью леченияи профилактики заболеваний дыхательных путей и легких. Может использоваться в домашних условиях и в лечебно-профилактических в учреждениях, производя мелкодисперсныйаэрозоль и пригоден для ингаляции препаратами на водной основе.

Способ применения и дозы

До начала использования данного устройства, прочтите до конца инструкцию по применению и всю прочую документацию, вложенную в упаковку устройства.При использовании электроприбора, особенно в присутствии детей, надлежит всегда соблюдать основные правила техники безопасности.Перед установкой и применением ингалятора следует провести его проверку - подсоединить систему распыления и проверить правильность работы ингалятора. Отсоедините шланги Отверните крышку чашки распыления, Наполните чашку распыления лекарственным средством в соответствии с указанием врача до уровня между минимальной и максимальной отметкой. Не превышайте максимальный уровень (максимальный объем 6 мл) (суспензионный или вязкий раствор лекарственного средства нельзя применять с данным оборудованием). Заверните крышку чашки распыления. Подсоедините насадку-тройник и мундштук. После установки, дайте изделию поработать 1-2 минуты, а затем соедините трубкой штуцер компрессора и распылитель. Проверьте правильность работы системы распыления.Примечание: В процессе проведения терапии мундштук должен находиться во рту, и рот должен быть закрыт. После завершения терапии, необходимо своевременно провести дезинфекцию во избежание перекрестного инфицирования.

Противопоказания

Температура тела выше 37,5 оС, Мокрота с гнойным компонентом, Носовые кровотечения или склонность к таковым, Кровохарканье, Непереносимость лекарственного вещества, Аритмия, Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, такие, как сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь III степени, перенесенный менее 6 месяцев назад инфаркт или инсульт, атеросклероз сосудов головного мозга с нарушением мозгового кровообращения, Тяжелые заболевания дыхательной системы, такие, как дыхательная недостаточность III степени, эмфизема, каверны в легких, рецидивирующий пневмоторакс, Спонтанный пневмоторакс, Легочное кровотечение, Сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, Грубые нарушения сердечного ритма.

Особые указания

Ограничения применения Так как размеры производимых небулайзером «Armed» частиц находятся в пределах до 5 микрон, запрещено использовать с ним отвары лекарственных трав с видимыми глазу включениями и препараты на масляной основе.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.