Инструкция по применению
Иноферт Порошок 1 г Саше 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Саше
Страна: Италия
Производитель: ИТАЛФАРМАКО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Инозитол+фолиевая кислота
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 36

Описание

ИНОЗИТ Инозит (Мио-Инозитол, Витамин B8) является витаминным фактором группы B. Среди овощей наибольшее количество инозита содержат цитрусовые фрукты, цельные злаки, сухофрукты (арахис), семена (ростки пшеницы), бобовые культуры (бобы), дрожжи. Фрукты и свежие овощи содержат больше инозита, чем замороженные, консервированные и засоленные продукты. В организме человека он присутствует в фосфолипидах и может стимулировать эндогенную продукцию лецитина. Кроме того, его биологическая роль заключается в специфическом воздействии, контролирующем метаболизм жиров и сахаров и клеточные функции нервной системы. И наконец, он важен для роста волос и предотвращения облысения. Научно доказано, что инозит может изменять некоторые гормональные параметры, например: помогает снижать уровень ЛГ (лютеинизирующего гормона), тестостерона и пролактина в плазме, а также принимать участие в снижении соотношения ЛГ/ФСГ (фолликулостимулирующего гормона). Инозит принимает участие в восстановлении регулярности менструального цикла и овуляции. Благодаря модулирующему воздействию на функцию яичников, инозит используют в протоколах контролируемой гиперстимуляции яичников. В случае инсулинорезистентности или диабета II типа, инозит обладает способностью улучшать общую метаболическую картину. В случае поликистоза яичников инозит способствует нормализации патофизиологических механизмов, связанных с метаболическими и репродуктивными нарушениями. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА Фолиевая кислота является водорастворимым витамином группы B(витамин B9). Фолиевая кислота играет важную роль в метаболизме аминокислот, синтезе белка и нуклеиновых кислот (прежде всего в продукции ДНК и РНК) и репарации хромосом. Поэтому она очень важна для нормального деления клеток и роста тканей. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах с большими листьями, в печени, яйцах и бобовых, при этом её содержание во фруктах (за исключением, апельсинов), мясе и молоке довольно низкое. Во время приготовления пищи почти полностью разрушается до фолатов (90%) за несколько минут.

Действующее вещество

Инозитол+фолиевая кислота

Состав

на 1 пакетик-саше: инозит (1000 мг), фолиевая кислота (0,1 мг)

Форма выпуска

Саше

Показания

Иноферт можно применять в качестве - дополнительного источника фолиевой кислоты, источника инозита, в качестве вспомогательного препарата в протоколах контролируемой гиперстимуляции яичников. Кроме того, Иноферт можно применять в качестве вспомогательного препарата при поликистозе яичников при инсулинорезистентности, предиабете и диабете II типа.

Способ применения и дозы

Иноферт можно принимать в любое время в течение дня. Рекомендуется принимать взрослым по 1 пакетику в день во время приема пищи. Растворить порошок в стакане воды. Продолжительность приема 1 месяц.

Противопоказания

Превышать предписанную дозу не рекомендуется. Продукт следует применять при соблюдении разнообразной и сбалансированной диеты, придерживаясь здорового образа жизни. Продукт следует использовать в течение срока годности, указанного на упаковке.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.