Инструкция по применению
Инстенон раствор для инъекций ампулы 2мл N5

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Австрия
Производитель: Сотекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гексобендин+Этамиван+Этофиллин
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 2 мл
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Гексобендин+Этамиван+Этофиллин

Состав

Гексобендина дигидрохлорид 10 мг; этамиван 50 мг; этофиллин 100 мг.; Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 0.08 мг, пропиленгликоль - 416.00 мг, вода д/и - до 2.00 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Заболевания мозга сосудистого генеза и связанные с возрастными изменениями; последствия недостаточности кровоснабжения мозга; постинсультные состояния; головокружения, вызванные функциональными расстройствами мозга.

Способ применения и дозы

В зависимости от тяжести течения заболевания препарат вводят в/м или в/в (медленно) по 1 ампуле 1-2 раза/сут или в виде в/в капельной инфузии по 1 ампуле 1-2 раза/сут вместе с 250 мл 5% раствора левулезы.; В ряде случаев при быстром введении возможно снижение АД, поэтому продолжительность введения одной ампулы должна составлять не менее 3 мин.; По мере улучшения состояния лечение может быть продолжено препаратом в форме таблеток, покрытых оболочкой.; Внутрь назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут или по 1 таб. форте 3 раза/сут (максимально 5 таб.) в течение 6 недель.

Противопоказания

— состояние сильного возбуждения; — судорожный синдром; — эпилепсия; — симптомы повышенного внутричерепного давления (длительная головная боль, рвота, нарушение зрения); — кровоизлияние в мозг; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации Инстенон применяют только по строгим показаниям.

Побочные действия

В отдельных случаях: при применении в высоких дозах - головная боль, гиперемия лица, снижение АД.

Передозировка

Симптомы: возможны головные боли, тахикардия, гиперемия лица.; Лечение: рекомендуется отмена препарата с последующим возобновлением приема в меньшей дозе.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении Инстенона и препаратов, уменьшающих активность тромбоцитов (в т.ч. ацетилсалициловой кислоты), возможно усиление антиагрегантного действия, обусловленное влиянием гексобендина.; При применении кофеина в высоких дозах возможно уменьшение эффективности Инстенона (следует избегать употребления кофе и чая в больших количествах).

Особые указания

В ряде случаев при быстром в/в введении может понизиться АД, поэтому продолжительность введения одной ампулы должна составлять не менее 3 мин.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;В период лечения необходимо соблюдать осторожность при занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении