Инструкция по применению
Инстиллагель Гель-шприц 11 мл 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Фарко-Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лидокаин+Хлоргексидин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2 г+ 0,05 г/100 мл

Описание

Антисептическое средство+местный анестетик

Действующее вещество

Лидокаин+Хлоргексидин

Состав

лидокаина гидрохлорид 20 мг хлоргексидина дигидрохлорид 500 мкг

Форма выпуска

Гель

Показания

Профилактика инфекции и анестезия при катетеризации мочеиспускательного канала, эндоскопических исследованиях. Оперативные и диагностические вмешательства у детей и взрослых в урологии, гинекологии, проктологии: все формы эндоскопии, замена фистульных катетеров, интубация и ИВЛ.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Местно. По одной дозе в область наружного отверстия мочеиспускательного канала, в полости шейки матки.

Противопоказания

Гиперчувствительность, дети в возрасте до 2 лет. С осторожностью: I триместр беременности.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: I триместр беременности В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.

Побочные действия

Местные реакции: аллергические реакции (аллергический дерматит, кожная сыпь, ангионевротический отек), жжение в месте аппликации. Системные реакции: анафилактический шок, снижение АД, брадикардия, судороги.

Взаимодействие с другими препаратами

Избегать совместного применения с препаратами йода. Ингибиторы МАО усиливают местноанестезирующее действие лидокаина. Несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Совместим с лекарственными средствами, содержащими катионную группу (бензалкония хлорид).

Особые указания

Может вызывать аллергические реакции, в т.ч. замедленного типа. Региональная и местная анестезия должны проводить опытные специалисты в соответствующим образом оборудованном помещении при доступности готового к немедленному использованию оборудования и препаратов необходимых для мониторинга сердечной деятельности и реанимационных мероприятий.