Инструкция по применению
Инстиллагель Шприц одноразовый 6 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Фарко-Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лидокаин+Хлоргексидин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2 г+ 0,05 г/100 мл



Описание

Гель для местного применения Инстиллагель - комбинированный препарат, оказывающий антисептическое и местно-анестезирующее действие. Противомикробное действие и адекватная анестезия развивается через 5-10 мин. после применения препарата. Водорастворимый прозрачный гель обеспечивает четкий оптический обзор при различных эндоскопических процедурах.

Действующее вещество

Лидокаин+Хлоргексидин

Состав

Лидокаин, хлоргексидин, метил 4-гидроксибензоат, пропил-4-гидрокосибензоат, пропиленгликоль, гидроксиэтилцеллюлоза, вода.

Форма выпуска

Гель

Показания

В урологии: профилактика инфекционных осложнений, для смазывания и анестезии: при катетеризации уретры, введении и смены постоянного катетера, уретроскопии и цистоскопии, бужировании уретры, оперативных вмешательствах на уретре и мочевом пузыре, трансуретральной простатэктомии, лечении дизурии и цисталгии, манипуляциях на нефростоме, уродинамическом исследовании, местная терапия негоноррейных уретритов. В акушерстве и гинекологии: профилактика инфекционных осложнений, для смазывания и анестезии: при предродовой санации шейки матки и влагалища, диагностическом выскабливании стенок цервикального канала и полости матки, введении и удалении внутриматочных контрацептивов (ВМС), гистероскопии, биопсии шейки матки, биопсии эндометрия, полипэктомии шейки матки при оперативных вмешательствах трансвагинальным доступом, артифициальных абортах. В составе комбинированной терапии бактериального цервицита, неспецифического кольпита, хронического эндометрита. В абдоминальной хирургии и проктологии: профилактика инфекционных осложнений, для смазывания и анестезии: при всех видах эндоскопических исследований, оперативных и диагностических вмешательствах в проктологии, для предохранения от повреждений прямой и толстой кишки при эндоскопических манипуляциях, при замене фистульных катетеров и дренажей, уходе за энтеростомами. А также: используется в качестве смазывающего, дезинфицирующего и местно анестезирующего средства при интубации и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), педиатрической практике.

Способ применения и дозы

Наружно. Зондирование и катетеризация: после первичной обработки наружных половых органов в мочеиспускательный канал вводится 6–11 мл геля. Цистоскопия: вводят 6–11 мл геля в мочеиспускательный канал, включая наружный сфинктер, при необходимости введение повторяют.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату и алкил-4-гидроксибензоатам (парабены), выраженная брадикардия (возможно угнетение сердечно-сосудистой системы).

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью (1 триместр)

Побочные действия

Аллергические реакции (аллергический дерматит, кожная сыпь, отек Квинке), жжение в месте аппликации.

Передозировка

Симптомы: При тяжелых повреждениях мочеиспускательного канала возможно развитие побочных эффектов, связанных с системным действием лидокаина (брадикардия, судороги, коллапс), при неправильном применении препарата возможна ортостатическая гипертензия центрального генеза. Лечение: при брадикардии - бета-адреностимуляторы (алупент), при судорогах - небольшие дозы барбитуратов короткого действия или короткодействующие миорелаксанты (сукцинилхолин), при коллапсе - эпинефрин или допамин

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное применение с антиаритмическими препаратами может привести усилению выраженности побочных эффектов лидокаина. Ингибиторы МАО усиливают местноанестезирующее действие лидокаина. Несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза).

Особые указания

Препарат стерилен и предназначен для одноразового введения. В случае применения в период лактации следует воздерживаться от кормления ребенка грудью в течение 12 ч после использования препарата.