Инструкция по применению
Интеллан сироп 90 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гинкго двулопастного листьев экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Интеллан – комплексный растительный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав растениями, богатыми биоактивными алкалоидами, флавоноидами, сапонинами, гликозидами, аминокислотами, витаминами и необходимыми микроэлементами.

Действующее вещество

Гинкго двулопастного листьев экстракт

Состав

сухой водный экстракт листьев гинкго двулопастного (5:1) 50 мг, густой водный экстракт целого растения щитолистника азиатского (4.54:1) 200 мг, густой водный экстракт надземных частей бакопа моннье (Bacopa Monnieri) (4.23:1) 25 мг, густой водный экстракт плодов кориандра посевного (4.09:1) 40 мг, густой водный экстракт плодов и семян аммомума шиловидного (3.97:1) 40 мг, густой экстракт плодов филлантуса лекарственного (4.23:1) 50 мг. Вспомогательные вещества: сахароза - 7 г, лимонная кислота безводная - 20 мг, глицерол - 0.1 мг, метилпарагидроксибензоат - 10 мг, пропилпарагидроксибензоат - 2 мг, пропиленгликоль - 0.05 мг, ароматизатор "сладкий апельсин" - 0.01 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" - 0.05 мг, вода очищенная - 10 мл.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Астено-невротическая симптоматика на фоне соматических заболеваний в стадии ремиссии.

Способ применения и дозы

Внутрь по 2 чайные ложки 2 раза в день после еды. Длительность терапии - 4 недели.

Противопоказания

Психические и соматические заболевания в стадии обострения, тяжёлые патологии сердечно-сосудистой системы, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано назначение при беременности и в период лактации.

Побочные действия

При повышенной индивидуальной чувствительности возможно возникновение аллергических реакций.