Инструкция по применению
Интерфераль 100000 аэрозоль 10мл

Характеристики



Форма выпуска: Аэрозоль
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Интерферон альфа-2b
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 100000 МЕ

Действующее вещество

Интерферон альфа-2b

Состав

1 баллон интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 100000 МЕ. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101), повидон К25, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, магния стеарат. Состав оболочки: сополимер раствора метакриловой кислоты и метилметакрилата (1:1) - эудрагит L-12.5 (сухой), сополимер раствора метакриловой кислоты и метилметакрилата (1:1) - эудрагит S-12.5 (сухой), дибутилфталат, диэтилфталат, макрогол 400, макрогол 6000, масло семян клещевины обыкновенной, тальк, титана диоксид, краситель коричневый Евроблэнд (краситель солнечный закат желтый (Е110), краситель коричневый шоколадный НТ (Е155)).

Форма выпуска

Аэрозоль

Показания

Интерферон. Представляет собой высокоочищенный рекомбинантный протеин с молекулярной массой 19 300 дальтон. Получен из клона Escherichia coli путем гибридизации плазмид бактерий с геном человеческих лейкоцитов, кодирующим синтез интерферона. В отличие от интерферона альфа-2а имеет аргинин в положении 23. Оказывает противовирусное действие, которое обусловлено взаимодействием со специфическими мембранными рецепторами и индукцией синтеза РНК и, в конечном счете, белков. Последние, в свою очередь, препятствуют нормальной репродукции вируса или его высвобождению. Обладает иммуномодулирующей активностью, которая связана с активацией фагоцитоза, стимуляцией образования антител и лимфокинов. Оказывает антипролиферативное действие на опухолевые клетки.

Противопоказания

Вводят в/в или п/к. Дозу и схему лечения устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применять у пациентов с нарушениями функций почек, печени, костномозгового кроветворения, при склонности к суицидальным попыткам. У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возможна аритмия. Если аритмия не уменьшается или усиливается, дозу следует уменьшить в 2 раза, либо прекратить лечение. В период лечения необходим контроль неврологического и психического статуса. При выраженном угнетении костномозгового кроветворения необходимо регулярное исследование состава периферической крови. Интерферон альфа-2b оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, поэтому следует с осторожностью применять у пациентов, склонных к аутоиммунным заболеваниям, из-за повышения риска аутоиммунных реакций.

Побочные действия

Интерферон альфа-2b ингибирует метаболизм теофиллина и снижает его клиренс.

Особые указания

Интерферон альфа-2b ингибирует метаболизм теофиллина и снижает его клиренс.