Инструкция по применению
Интести-бактериофаг Раствор для приема внутрь 20 мл 4 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МИКРОГЕН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Интести-бактериофаг
Количество в упаковке: 4
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Интести-бактериофаг

Состав

Действующее вещество: Смесь стерильных фильтратов фаголизатов Shigella flexneri 1, 2, 3, 4, 6 сероваров, Shigella sonnei, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, Salmonella typhimurium, Salmonella infantis, Salmonella choleraesuis, Salmonella oranienburg, Salmonella enteritidis, энтеропатогенной Escherichia coli различных серогрупп, наиболее значимых в этиологии энтеральных заболеваний, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa - 20 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызванные бактериями дизентерии, сальмонеллами, эшерихиями коли, протеем, энтерококками, стафилококками, псевдомонас аэругиноза или их сочетанием: бактериальная дизентерия; салъмонеллез; диспепсия; дисбактериоз; энтероколит, колит. Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фоточувствительности возбудителя.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь и ректального введения. Для лечения препарат принимают внутрь 4 раза в день за 0,5 - 1 ч до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7-10 дней. Детям первых месяцев жизни в первые два дня приема препарат разводят кипяченой водой в два раза, в случае отсутствия побочных реакций (срыгивания, высыпаний на коже) в дальнейшем можно применять бактериофаг неразведенным. Препарат применяют через рот 3 раза в сутки за 30 минут до кормления. В случаях неукротимой рвоты препарат применяют в виде высоких клизм (через газоотводную трубку или катетер) ежедневно. Возможно сочетание ректального (в виде высоких клизм) и перорального применения препарата. Курс лечения 7 - 10 дней. Рекомендуемые дозировки препарата Возраст Доза на 1 прием (мл) перорально ректально 0 — 6 мес. 5 10 6 — 12 мес. 10-15 20 от 1 года до 3 лет 15-20 20-30 от 3 до 8 лет 20-30 30-40 от 8 лет и старше 30-40 50-60   При отсутствии колитического синдрома рекомендуется замена одного приема внутрь на однократное ректальное введение расовой возрастной дозы препарата в виде клизмы после опорожнения кишечника. В профилактических целях оптимальная схема использования - ежедневный прием расовой возрастной дозы. Продолжительность приема препарата определяется условиями эпидситуации. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Целесообразно применение препарата при наличии инфекций, вызванных фоточувствительными штаммами бактерий (по рекомендации врача).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение препарата возможно в сочетании с другими лекарственными средствами и не исключает использования других антибактериальных препаратов.

Особые указания

При помутнении препарат не применять! Вследствие содержания в препарате питательной среды, в которой могут развиваться бактерии из окружающей среды, вызывая помутнение препарата, необходимо при вскрытии флакона соблюдать следующие правила: Тщательно мыть руки. Обработать колпачок спиртсодержащим раствором. Снять колпачок, не открывая пробки. Не класть пробку внутренней поверхностью на стол или другие предметы. Не оставлять флакон открытым. Вскрытый флакон хранить только в холодильнике. При использовании малых доз (2-8 капель) препарат необходимо отбирать стерильным шприцем в объеме 0,5-1 мл. Препарат из вскрытого флакона при соблюдении условий хранения, вышеперечисленных правил и отсутствии помутнения может быть использован в течение всего срока годности. Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами Отсутствуют.

Условия хранения

В сухом месте