Инструкция по применению
Интетрикс капсулы N20

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: ИПСЕН
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тилброхинол+Тилихинол+Тилихинола лаурилсульфат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 50 мг+50 мг+200 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Тилброхинол+Тилихинол+Тилихинола лаурилсульфат

Состав

Тилихинол 50 мг,Тилихинола N-додецил сульфат 50 мг ,Тилброхинол 200 мг .Прочие ингредиенты: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, желатин, титана диоксид (E171), азорубин (E122), индиготин (E132).

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Кишечный амебиаз у взрослых:-как дополнительное средство к терапии тканевыми амебицидами;-как монотерапия при бессимптомном носительстве амебиаза.

Способ применения и дозы

Внутрь, при острых кишечных инфекциях 4-6 капсул в сутки в течение 3-5 дней; при хроническом амебиозе -4 капсулы в сутки в течение 10 суток (максимальная длительность лечения 4 нед.).Для профилактики кишечных инфекций и поноса во время путешествий - 2 капсулы в день в течение путешествия и 3-х дней по возвращении.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ввиду отсутствия клинического опыта применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано.

Побочные действия

в единичных случаях отмечали повышение уровня печеночных трансаминаз; большинство из них были бессимптомными и заканчивались снижением уровня после прекращения лечения.Сообщалось о развитии гепатита.Сообщалось о некоторых редких кожных реакциях гиперсенситивного (крапивница, отек Квинке) или буллезного типа (постоянная пигментная эритема).В исключительных случаях при длительном применении сообщалось о периферической нейропатии или поражении зрительного нерва.

Передозировка

при случайном применении препарата в высокой дозе необходим тщательный контроль уровня печеночных трансаминаз в плазме крови, а также уровня протромбина.

Взаимодействие с другими препаратами

Неизвестны.

Особые указания

результаты клинических исследований подтвердили, что у здоровых добровольцев Интетрикс часто приводит к умеренному асимптоматическому и обратимому повышению уровня печеночных трансаминаз. Поэтому в случае повышения уровня трансаминаз и особенно при развитии желтухи применение лекарственного средства следует прекратить.Продолжительное применение Интетрикса не рекомендуется ввиду риска возникновения периферической нейропатии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Интетрикс нельзя назначать одновременно с другими препаратами, содержащими гидроксихинолины. Лекарственное средство содержит краситель азорубин (Е122) и может вызвать аллергические реакции.Не применять Интетрикс длительное время из-за риска возникновения периферической или оптической нейропатии.Препарат содержит лактозу, поэтому его применение не рекомендуется пациентам с непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции (редкое наследственное заболевание).У женщин репродуктивного возраста препарат применяют только при условии использования надежных методов контрацепции.Применение в период беременности и кормления грудью. Надежные данные о потенциальных тератогенных эффектах Интетрикс у животных отсутствуют.В настоящее время отсутствуют необходимые данные в достаточном количестве, чтобы оценить потенциальный мальформационный или фетотоксический эффект этого лекарственного средства при применении его в период беременности.Лекарственное средство можно применять женщинам репродуктивного возраста только при условии использования надежных методов контрацепции.Не применять препарат в период беременности и кормления грудью. Следует обратиться за советом к врачу, прежде чем применять какие-либо лекарственные средства.Дети. Не применяют у детей.Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.

Условия хранения

Беречь от детей