Инструкция по применению
Ипидакрин Таблетки 20 мг 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармпроект
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ипидакрин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 20 мг
Срок годности: 24

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета, с фаской.

Действующее вещество

Ипидакрин

Состав

Действующим веществом является: ипидакрина гидрохлорида моногидрат (в пересчете на ипидакрина гидрохлорид). Каждая таблетка содержит ипидакрина гидрохлорида моногидрат — 21,6 мг (в пересчете на ипидакрина гидрохлорид — 20,0 мг). Прочими вспомогательными веществами являются: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кальция стеарат. Препарат Ипидакрин содержит лактозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью. Думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Ипидакрин повышает тонус матки и может вызывать преждевременные роды. Применение препарата Ипидакрин во время беременности противопоказано. Грудное вскармливание Применение препарата Ипидакрин во время грудного вскармливания противопоказано.

Особые указания

Дети и подростки Препарат Ипидакрин противопоказан к применению детям и подросткам в возрасте от 0 до 18 лет. Препарат Ипидакрин с алкоголем Алкоголь усиливает нежелательные реакции препарата. Не принимайте алкоголь во время лечения препаратом Ипидакрин. Препарат Ипидакрин содержит лактозу Препарат Ипидакрин содержит лактозу. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Препарат Ипидакрин может вызывать головокружение, поэтому во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами, а также занятий потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните при температуре ниже 25 °C.