Инструкция по применению
Ипидакрин-СЗ Таблетки 20 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Северная Звезда
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ипидакрин
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические с фаской.

Действующее вещество

Ипидакрин

Состав

Препарат Ипидакрин-СЗ содержит Действующим веществом является ипидакрина гидрохлорид. Каждая таблетка содержит 20 мг ипидакрина (в виде гидрохлорида). Вспомогательными веществами являются: крахмал картофельный, лактозы моногидрат (сахар молочный), поливиниловый спирт, кальция стеарат

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Ипидакрин-СЗ предназначен для лечения у взрослых в возрасте от 18 лет. - При заболеваниях периферической нервной системы: частичная или полная потеря болевой чувствительности (моно- и полинейропатия); лечение боли в шее, конечностях, пояснице, области внутренних органов и др. (полирадикулопатия); мышечная слабость (миастения и миастенический синдром); - При заболеваниях центральной нервной системы: нарушения функций глотания, звучности голоса, произношения звуков (бульбарные параличи и парезы); восстановительный период после двигательных и/или умственных нарушений; - Для лечения и профилактики атонии кишечника.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Ваш лечащий врач подберёт необходимую для Вас дозу препарата. При заболеваниях периферической нервной системы: частичная и полная потеря болевой чувствительности (моно- и полинейропатия); лечение боли в шее, конечностях, пояснице, области внутренних органов и др. (полирадикулопатия); мышечная слабость (миастения и миастенический синдром) Рекомендуемая доза составляет 10-20 мг (0,5-1 таблетка) 1-3 раза в день. В зависимости от тяжести заболевания лечащий врач может увеличить дозу до 20-40 мг (1-2 таблетки) 5 раз в день. Врач назначит Вам курс лечения от 1 до 2 месяцев, который можно повторить несколько раз с перерывом в 1-2 месяца. При заболеваниях центральной нервной системы: нарушения функций глотания, звучности голоса, произношения звуков (бульбарные параличи и парезы); восстановительный период после двигательных и/или умственных нарушений Рекомендуемая доза составляет 10-20 мг (0,5-1 таблетка) 2-3 раза в день. Врач назначит Вам курс лечения от 2 до 6 месяцев в зависимости от тяжести заболевания. Для лечения и профилактики атонии кишечника Рекомендуемая доза составляет 20 мг (1 таблетка) 2-3 раза в день в течение 1-2 недель. Максимальная суточная доза 200 мг. Применение у детей и подростков Препарат Ипидакрин-СЗ противопоказан для детей и подростков младше 18 лет. Путь и способ введения Принимайте таблетку внутрь, запивая водой. Продолжительность терапии Продолжительность лечения определяет Ваш лечащий врач индивидуально в зависимости от заболевания.

Противопоказания

Не принимайте препарат Ипидакрин-СЗ: - если у Вас аллергия на ипидакрин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша); - если у Вас заболевание мозга с внезапными судорожными приступами (эпилепсия), так как препарат может обострить течение заболевания; - если у Вас заболевания, характеризующиеся различными непроизвольными избыточными движениями; - если у Вас ощущение дискомфорта, боли в грудной клетке, связанные с недостаточным поступлением крови к сердцу (стенокардия), замедленный сердечный ритм (брадикардия); - если у Вас заболевание с приступами удушья, хрипами, одышкой (бронхиальная астма); - если у Вас механическая непроходимость кишечника или мочевыводящих путей; - если у Вас нарушение равновесия с головокружением, тошнотой, рвотой (вестибулярные расстройства); - язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; - если Вы беременны или кормите грудью; - если Ваш возраст менее 18 лет (в связи с недостаточной изученностью эффективности и безопасности). Беременность и лактация: Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приёма препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Ипидакрин повышает тонус матки и может вызывать преждевременные роды. Не принимайте препарат Ипидакрин-СЗ во время беременности. Грудное вскармливание Сведения, подтверждающие выделение препарата Ипидакрин-СЗ с грудным молоком у женщин, отсутствуют. Не принимайте препарат Ипидакрин-СЗ в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Ипидакрин-СЗ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Возможно развитие тяжёлых побочных явлений, которые наблюдались часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10) Немедленно сообщите врачу, если заметите появление следующих симптомов: - замедленный сердечный ритм (признаки брадикардия). Возможно развитие тяжёлых побочных явлений неизвестной частоты (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): Немедленно сообщите врачу, если заметите появление следующих симптомов: - затруднённое свистящее дыхание, затруднённое глотание; отёк лица, губ, языка или горло; сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей, повышение температуры тела (признаки аллергической реакции, включая аллергический дерматит, анафилактический шок, астму, токсический эпидермальный некролиз, эритему, крапивницу). Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приёме препарата Ипидакрин-СЗ Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): - учащённое сердцебиение; - слюнотечение, тошнота; - повышенная потливость. Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): - головокружение, головная боль, сонливость; - усиленное выделение мокроты из бронхов; - рвота; - аллергия на коже в виде зуда, сыпи; - мышечные судороги; - слабость. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): - понос; - боль в верхней центральной области живота. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарат Ипидакрин-СЗ больше, чем следовало Симптомы При передозировке могут появиться следующие симптомы: снижение аппетита, одышка и хрипы, слезотечение, усиленное потоотделение, сужение зрачков, неконтролируемые движения глаз, спонтанная дефекация и мочеиспускание, рвота, замедленный сердечный ритм, нарушение сердечного ритма, снижение артериального давления, беспокойство, тревога, возбуждение, чувство страха, нарушение моторики движений, неразборчивая речь, судороги, кома, сонливость и общая слабость. Выраженность симптомов может быть слабая. Лечение Если Вы приняли дозу препарата выше рекомендованной, незамедлительно обратитесь к лечащему врачу или в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. При возможности, возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. Если Вы забыли принять препарат Ипидакрин-СЗ Продолжайте регулярный прием препарата в соответствии с рекомендациями врача. Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной. Если Вы прекратили приём препарата Ипидакрин-СЗ Не прекращайте приём препарата Ипидакрин-СЗ, не посоветовавшись с врачом. При наличии вопросов по приёму препарата, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Особенно важно сообщить врачу о приёме следующих лекарственных препаратов: - средства, угнетающие центральную нервную систему, так как Ипидакрин-СЗ усиливает успокаивающее действие этих средств; - другие препараты, стимулирующие проведение импульсов в нервной системе, поскольку повышается риск нежелательных реакций; - бета-адреноблокаторы (средства для лечения при повышенном давлении и учащённом сердечном ритме), так как совместный приём с Ипидакрином-СЗ может критически замедлить сердечный ритм; - местные анестетики, антибиотики группы аминогликозиды (антибактериальные препараты), калия хлорид, так как Ипидакрин-СЗ ослабляет действие этих средств. Препарат Ипидакрин-СЗ с алкоголем Алкоголь усиливает нежелательные реакции препарата. Не принимайте алкоголь во время лечения препаратом Ипидакрин-СЗ.

Особые указания

Перед приёмом препарата Ипидакрин-СЗ проконсультируйтесь с лечащим врачом. Сообщите Вашему врачу, если у Вас имеется сейчас или было когда-либо раньше любое из следующих состояний или заболеваний: - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; - заболевания щитовидной железы; - заболевания сердца и сосудов; - заболевания дыхательных путей. Дети и подростки Не давайте препарат Ипидакрин-СЗ детям от 0 до 18 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (препарат Ипидакрин-СЗ противопоказан для детей и подростков младше 18 лет). Препарат Ипидакрин-СЗ содержит лактозу Препарат Ипидакрин-СЗ содержит лактозы моногидрат (сахар молочный). Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приёмом данного препарата. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Во время лечения препаратом Ипидакрин-СЗ воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

от 2# до 25#