Инструкция по применению
Ипигрикс Раствор для внутримышечного и подкожного введения 15 мг/мл 1 мл ампулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Латвия
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ипидакрин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 15 мг/мл

Действующее вещество

Ипидакрин

Состав

1 мл ипидакрина гидрохлорид 16.2 мг, что соответствует содержанию ипидакрина 15 мг.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

Ингибитор холинэстеразы. Препятствует ферментному гидролизу ацетилхолина и удлиняет его действие. Блокирует калиевые каналы мембран и способствует их деполяризации. Стимулирует синаптическую передачу в нервно-мышечных окончаниях, проведение возбуждения в нервных волокнах, усиливает действие на гладкие мышцы ацетилхолина и других медиаторов (в т.ч. эпинефрина, серотонина, гистамина, окситоцина), восстанавливает нервно-мышечную передачу и проведение возбуждения в периферической нервной системе (из-за нарушений различного генеза: травм, воспаления, действия местных анестетиков, антибиотиков, токсинов, калия хлорида). Повышает тонус и сократимость гладкой мускулатуры внутренних органов, в т.ч. ЖКТ и бронхов (вплоть до бронхоспазма), урежает ЧСС, усиливает секрецию слюнных желез, сократительную активность миометрия, тонус скелетной мускулатуры. Оказывает стимулирующее действие на ЦНС в сочетании с отдельными проявлениями седативного действия . способствует улучшению обучаемости и памяти.

Противопоказания

Внутрь, п/к, в/м. Разовая доза – 10-40 мг. Максимальная доза – 200 мг/сут. Кратность приема и длительность лечения зависят от показаний.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует применять при язвенной болезни желудка, тиреотоксикозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Необходимо учитывать способность ипидакрина повышать тонус матки. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Не следует применять у пациентов, деятельность которых связана с вождением транспортных средств и с работой, требующей высокой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Побочные действия

При одновременном применении ипидакрин усиливает седативное действие лекарственных средств, оказывающих угнетающее влияние на ЦНС, этанола, действие других ингибиторов холинэстеразы и м-холиномиметиков. У пациентов с миастенией при применении ипидакрина на фоне других холинергических средств повышается риск развития холинергического криза. При одновременном применении с бета-адреноблокаторами усиливается брадикардия. Ипидакрин ослабляет действие местных анестетиков, антибиотиков, калия хлорида. Атропин и метоциния йодид уменьшают выраженность симптомов передозировки.

Особые указания

При одновременном применении ипидакрин усиливает седативное действие лекарственных средств, оказывающих угнетающее влияние на ЦНС, этанола, действие других ингибиторов холинэстеразы и м-холиномиметиков. У пациентов с миастенией при применении ипидакрина на фоне других холинергических средств повышается риск развития холинергического криза. При одновременном применении с бета-адреноблокаторами усиливается брадикардия. Ипидакрин ослабляет действие местных анестетиков, антибиотиков, калия хлорида. Атропин и метоциния йодид уменьшают выраженность симптомов передозировки.