Инструкция по применению
Ипигрикс Таблетки 20 мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Латвия
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ипидакрин
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 20 мг/мл

Действующее вещество

Ипидакрин

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Заболевания периферической нервной системы (ПНС): моно- и полинейропатия, полирадикулопатия, миастения и миастенический синдром Заболевания центральной нервной системы (ЦНС): бульбарные параличи и парезы, восстановительный период органических поражений ЦНС Атония кишечника

Способ применения и дозы

Заболевания ПНС - по 20 мг (1 таб.) 1-3 раза в день. Курс 1-2 мес. Перерыв - 1-2 мес. Заболевания ЦНС - по 20 мг 2-3 раза/день. Курс - 2-6 мес. Повтор – при необходимости. Атония кишечника - по 20 мг 2-3 раза/день 1-2 недели. Максимальная суточная доза - 200 мг.

Противопоказания

гиперчувствительность, эпилепсия, экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами, стенокардия, выраженная брадикардия, бронхиальная астма, вестибулярные нарушения, обострение язвы желудка или ДПК, механическая непроходимость кишечника или мочевыводящих путей, непереносимость лактозы, беременность, лактация, возраст до 18 лет.

Условия хранения

при температуре не выше 25оС, в недоступном для детей месте.