**Инструкция по применению**
**Ипрожин Капсулы 100 мг 30 шт**

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: ИТАЛФАРМАКО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Прогестерон
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 36.0




## Действующее вещество

Прогестерон

## Состав

1 капсула содержит:Активное вещество: прогестерон 100 мг.

## Форма выпуска

Капсулы

## Фармакокинетика

При приеме внутрь хорошо всасывается в ЖКТ, время достижения Cmax - 1-3 ч. После приема 200 мг концентрация прогестерона в плазме увеличивается с 0.13 нг/мл до 4.25 нг/мл через 1 ч и составляет 11.75 нг/мл через 2 ч, 8.37 нг/мл - через 3 ч, 2 нг/мл - через 6 ч, 1.64 нг/мл - через 8 ч.При интравагинальиом применении быстро всасывается, высокая концентрация прогестерона в плазме наблюдается через 1 ч. Время достижения Cmax - 2-6 ч. При введении 100 мг 2 раза/сут средняя концентрация - 9.7 мг/мл в течение 24 ч. При введении более 200 мг концентрация прогестерона соответствует I триместру беременности. Связь с белками плазмы - 90%. Метаболизируется в печени с участием ферментной системы CYP2C19. Основные метаболиты - 20-альфа-гидрокси-дельта-4-альфа-прегнанолон и 5-альфа-дигидропрогестерон. Выводится почками - 50-60%.

**Показания**

Для приема внутрь:- Предменструальный синдром;- Фиброзно-кистозная мастопатия;- Пременопауза;- В качестве гестагенного компонента заместительной гормонотерапии в постменопаузе (в сочетании с эстрогенами);Интравагинально:- Заместительная гормонотерапия с нефункционирующими (отсутствующими) яичниками в случае полного недостатка прогестерона (донорство яйцеклеток);- Поддержка лютеиновой фазы во время подготовки к ЭКО;- Поддержка лютеиновой фазы в спонтанном или индуцированном менструальном цикле;- Преждевременная менопауза, постменопауза (в сочетании с эстрогенами);- Профилактика привычного и угрожающего выкидыша, вследствие гестагенной недостаточности;- Эндокринное бесплодие;- Профилактика миомы матки;- Эндометриоз.

**Способ применения и дозы**

Строго следуйте рекомендуемой дозировке, если только не будет других указаний от врача.Внутрь: вечером перед сном (не рекомендуется принимать до, после или во время еды).При предменструальном синдроме, фиброзно-кистозной мастопатии, дисменорее, пременопаузе - 200-300 мг в течение 10 дней (с 17 по 26 день цикла); при заместительной гормонотерапии в постменопаузе на фоне приема эстрогенов - 200 мг/сут, в течение 10-12 дней.Интравагинально:При донорстве яйцеклеток (на фоне эстрогенной терапии) - по 100 мг/сут на 13 и 14 дни цикла, затем по 100 мг 2 раза/сут, с 15 по 25 день цикла; с 26 дня и в случае определения беременности доза возрастает на 100 мг/сут каждую неделю, достигая максимума 600 мг в 3 приема (на протяжении 60 дней).Для поддержки лютеиновой фазы во время проведения цикла ЭКО - по 400-600 мг/сут, начиная со дня инъекции ХГ до 12 недели беременности.Для поддержки лютеиновой фазы в спонтанном или индуцированном менструальном цикле, при бесплодии, связанном с нарушением функции желтого тела - по 200-300 мг /сут, начиная с 17 дня цикла в течение 10 дней; в случае задержки менструации и диагностики беременности лечение должно быть продолжено. При угрозе или профилактике аборта - 100-200 мг 2 раза/сут ежедневно, до 12 недели беременности. Продолжительность лечения определяется характером и особенностями состояния пациента.

**Противопоказания**

- Склонность к тромбозам;- Острые формы флебита или тромбоэмболических заболеваний;- Кровотечения из влагалища неясного генеза;- Неполный аборт;- Порфирия;- Установленные или подозреваемые злокачественные новообразования молочных желез и половых органов;- Повышенная чувствительность к любому из ингредиентов препарата.С осторожностью: заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, мигрень, депрессия; гиперлипопротеинемия, период лактации.Пероральный путь введения - при выраженных нарушениях функции печени.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Следует с осторожностью применять при беременности из-за риска нарушения функции печени.С осторожностью - в период лактации.

**Побочные действия**

Аллергические реакции, сонливость, преходящее головокружение (через 1-3 ч после применения препарата), сокращение менструального цикла, межменструальное кровотечение.

**Передозировка**

Возможны нежелательные эффекты, перечисленные выше, которые исчезают при уменьшении дозы препарата.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Усиливает действие диуретиков, гипотензивных лекарственных средств, иммунодепрессантов, антикоагулянтов.Уменьшает лактогенный эффект окситоцина.

**Особые указания**

Препарат нельзя применять с целью контрацепции.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПри пероральном приеме необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В сухом месте