Инструкция по применению
Ишенор Таблетки 10 мг 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Розувастатин
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 36



Описание

Таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Розувастатин

Состав

Действующим веществом препарата является розувастатин. Ишенор®, 5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка содержит 5,2 мг розувастатина кальция, эквивалентно 5 мг розувастатина. Ишенор®, 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка содержит 10,4 мг розувастатина кальция, эквивалентно 10 мг розувастатина. Прочими (вспомогательными) веществами являются: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, кальция гидрофосфата дигидрат, магния стеарат; пленочная оболочка: гипромеллоза 2910, лактозы моногидрат, титана диоксид, триацетин.

Форма выпуска

Таблетки

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Ишенор**®** проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат Ишенор**®** во время беременности. Если Вы забеременели во время лечения препаратом Ишенор**®**, немедленно прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. Грудное вскармливание Не принимайте препарат Ишенор**®** в период грудного вскармливания. Женщины с детородным потенциалом Женщинам с сохраненным детородным потенциалом рекомендуется использовать надежные методы контрацепции во время лечения препаратом Ишенор**®**.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Ишенор**®** **больше, чем следовало** Если Вы приняли препарата Ишенор® больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу или свяжитесь с ближайшим пунктом скорой помощи. Ио возможности покажите медицинскому работнику упаковку препарата Ишенор®.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 30 °C.